

10 / 521329

14 JAN 2005

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 03 jan 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

BREVET D'INVENTION


26bis, rue de Saint-Pétersbourg
75800 Paris Cédex 08
Téléphone: 01 53.04.53.04 Télécopie: 01.42.94.86.54

Code de la propriété intellectuelle-livreVI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

| | |
|--|---|
| DATE DE REMISE DES PIÈCES: 18 JUIL. 2002 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL: DÉPARTEMENT DE DÉPÔT: 75.0209156 DATE DE DÉPÔT: 18 JUIL. 2002 | Chantal PEAUCELLE Cabinet ARMENGAUD AINE 3, Avenue Bugeaud 75116 PARIS France |
| Vos références pour ce dossier: CP.60735-1556 | |

| | | |
|--|---|--|
| 1 NATURE DE LA DEMANDE | | |
| Demande de brevet | | |
| 2 TITRE DE L'INVENTION | | |
| | | Composés à activité anti-parasitaire et médicaments les renfermant |
| 3 DECLARATION DE PRIORITE OU REQUETE DU BENEFICE DE LA DATE DE DEPOT D'UNE DEMANDE ANTERIEURE FRANCAISE | | Pays ou organisation Date N° |
| 4-1 DEMANDEUR | | |
| Nom | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) | |
| Rue | 3, rue Michel-Ange | |
| Code postal et ville | 75794 PARIS CEDEX 16 | |
| Pays | France | |
| Nationalité | France | |
| Forme juridique | Etablissement public | |
| N° de téléphone | 01-44-96-40-00 | |
| N° de télécopie | 01-44-96-53-90 | |
| 5A MANDATAIRE | | |
| Nom | PEAUCELLE | |
| Prénom | Chantal | |
| Qualité | CPI: 92-1189 | |
| Cabinet ou Société | Cabinet ARMENGAUD AINE | |
| Rue | 3, Avenue Bugeaud | |
| Code postal et ville | 75116 PARIS | |
| N° de téléphone | 01-45-53-05-50 | |
| N° de télécopie | 01-45-53-80-21 | |
| Courrier électronique | armengau@club-Internet.fr | |

| 6 DOCUMENTS ET FICHIERS JOINTS | | Fichier électronique | Pages | Détails |
|---|--|----------------------|----------|-----------------|
| Description | | desc.pdf | 73 | |
| Revendications | | V | 8 | 28 |
| Dessins | | | 1 | 1 fig., 3 ex. |
| Abrégé | | V | 3 | |
| Listage des sequences, PDF | | | | |
| Rapport de recherche | | | | |
| Chèque | | | 1 doc. | 0002372 |
| 7 MODE DE PAIEMENT | | | | |
| Mode de paiement | Remise d'un chèque | | | |
| Numéro de chèque | 0002372 | | | |
| Remboursement à effectuer sur le compte n° | 036 | | | |
| 8 RAPPORT DE RECHERCHE | | | | |
| Etablissement immédiat | | | | |
| 9 REDEVANCES JOINTES | Devise | Taux | Quantité | Montant à payer |
| 062 Dépôt | EURO | 35.00 | 1.00 | 35.00 |
| 063 Rapport de recherche (R.R.) | EURO | 320.00 | 1.00 | 320.00 |
| 068 Revendication à partir de la 11ème | EURO | 15.00 | 18.00 | 270.00 |
| Total à acquitter | EURO | | | 625.00 |
| 10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE | | | | |
| Signé par | Chantal PEAUCELLE | | | |
| |  | | | |

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Composés à activité anti-parasitaire et médicaments les renfermant

L'invention a pour objet des composés à activité anti-parasitaire, et plus spécialement antipaludique et antibabésiose.

De nombreux travaux sont consacrés à la recherche de médicaments actifs contre les parasites et spécialement contre les *Plasmodium*, en particulier *Plasmodium falciparum*, compte tenu de l'extension des maladies qu'ils provoquent.


Les inventeurs ont constaté, avec certaines catégories de composés chimiques, une activité élevée, s'accompagnant d'une toxicité tolérable et de propriétés de biodisponibilité élevées. Avantageusement, ces composés sont administrables par voie orale.

L'invention a donc pour but de fournir de nouveaux composés à activité anti-parasitaire, en particulier antipaludique.

Elle vise également un procédé de synthèse de tels composés.


L'invention vise en outre les médicaments renfermant de tels composés en tant que principes actifs ainsi que leur utilisation et celle de dérivés pour la fabrication de médicaments présentant lesdites activités.

Les composés selon l'invention sont caractérisés en ce qu'ils répondent à la formule générale (I)



dans laquelle

- soit X représente un groupe de formule (II)



où Z est un groupe $-(CH_2)_m$, avec $m = 8$ à 21 ,

$n = 0$ ou 1

5 et $Y = R_3$,

. R_1 et R'_1 , identiques ou différents l'un de l'autre, étant choisis parmi H, alkyl, aryl, OH, O-alkyl, O-aryl, O-CO-alkyl, O-CO-aryl, O-CO-O(ou S ou NH)-alkyl, O-CO-O(ou S ou NH)-aryl, PO(O-alkyl ou O-aryl)₂, CO-O-CH₂-aryl, cycloalkyl,

10 . R_2 et R'_2 , identiques ou différents l'un de l'autre, étant choisis parmi H, alkyl, CO-O-CH₂-aryl, CO-O-alkyl, cycloalkyl,

. R_3 et R'_3 , identiques ou différents l'un de l'autre, représentant H, alkyl, aryl, CO-O-alkyl, CO-O-aryl, COO-CH(R)-O-CO-alkyl, PO(O-alkyl ou O-aryl ou ONa)₂, CO-O-CH(R)-aryl,


. R étant H ou alkyl,

15 ou bien

. R_1 et R_2 , et/ou R'_1 et R'_2 , ou R_2 et R_3 et/ou R'_2 et R'_3 , forment ensemble un hétérocycle avec le ou les atomes d'azote auxquels ils sont respectivement attachés, ou encore,

20 . R_2 et R_3 et/ou R'_2 et R'_3 peuvent être le même substituant, doublement lié à l'azote, cyclisé avec, respectivement, R_1 ou R'_1 pour former un hétérocycle, le cas échéant

substitué par R_a , qui est choisi parmi H, alkyl, alkyl substitué par 1,2 ou 3 atomes d'halogène, aryl, CO-O-alkyl (ou aryl), -CO-OH, -CO-NH₂, -CN, -CO-NH-alkyl (ou aryl), -CO-N-(alkyl)₂, -CO-hétérocyle azoté et/ou oxygéné, NH(H ou alkyl), N(alkyl)₂, hétérocyle azoté et/ou oxygéné, -O-alkyl (ou aryl), -O-CH₂-aryl, CH₂N[H, (H, alkyl), (dialkyl), aryl], -CH₂-hétérocyle azoté et/ou oxygéné, CH₂-CO-OH,
 5 - soit $X = R_4$ et Y représente un groupe de formule (III)



avec n et Z tels que définis ci-dessus,

. R_1 et R'_1 , identiques ou différents l'un de l'autre, étant choisis parmi H, alkyl, aryl,
 10 OH, O-alkyl, O-aryl, O-CO-alkyl, O-CO-aryl, O-CO-O(ou S ou NH)-alkyl, O-CO-O(ou S ou NH)-aryl, PO(O-alkyl ou O-aryl)₂, CO-O-CH₂aryl, cycloalkyl,

. R_4 et R'_4 représentent H, alkyl ou aryl, et

. R_2 et R'_2 , identiques ou différents l'un de l'autre, étant choisis parmi H, alkyl, CO-O-CH₂aryl, CO-O-alkyl, cycloalkyl,

15 ou

. R_1 et R_4 et/ou R'_1 et R'_4 forment ensemble un groupe $-(\text{CH}_2)_p$, p étant un entier de 3 à 5, et R_2 et R'_2 représentant H, ou bien R_4 et R_2 et/ou R'_4 et R'_2 forment ensemble un groupe $-(\text{CH}_2)_p$, R_1 et R'_1 représentant H, et

les sels pharmacologiquement acceptables de ces composés,


A moins de précisions contraires,

- "aryle" désigne un phényle ou tout cycle ou hétérocycle, ayant un caractère aromatique, comme les cycles pyridine, oxazole, thiazole, le cas échéant substitué, en particulier de chlore, $-\text{NO}_2$, $-\text{NH}_2$, $\text{N}(\text{H}, \text{alkyle})$ ou (dialkyle);

5 - "hétérocycle azoté et/ou oxygéné" désigne un cycle à 5 ou 6 sommets comme les cycles pyrrolidine, pipéridine, morpholine, pipérazine, méthylpipérazine ;


- "alkyle" désigne un alkyle en C1-C5, à chaîne droite ou ramifiée, le cas échéant substitué par un ou plusieurs atomes d'halogène, groupe amino NH_2 , $\text{N}(\text{H}, \text{alkyle})$ ou (dialkyle).

10 Une famille préférée de dérivés de l'invention, ou famille A, répond à la formule (IV)



dans laquelle n, Z, $\text{R}_1, \text{R}'_1, \text{R}_2, \text{R}'_2, \text{R}_3$ et R'_3 sont tels que définis ci-dessus en rapport avec la formule (II)

15 Des composés avantageux de cette famille correspondent au cas où $n = 0$ et répondent à la formule (V)




Dans un groupe préféré, ou groupe a1, R_1 , R_2 et R_3 et/ou R'_1 , R'_2 et R'_3 sont indépendants les uns des autres.

Dans un sous-groupe, R_1 et/ou R'_1 , et R_2 et/ou R'_2 représentent un atome d'hydrogène, R_3 et/ou R'_3 étant tels que définis ci-dessus, mais différents d'un atome d'hydrogène.

- 5 Dans un autre sous-groupe, R_1 et/ou R'_1 sont tels que définis ci-dessus, mais ne représentent pas un atome d'hydrogène, alors que R_3 et/ou R'_3 , R_2 et/ou R'_2 représentent un atome d'hydrogène.

Un autre groupe préféré de composés de formule (V) correspond au cas où $n = 0$ et


- R_1 et R_2 , et/ou R'_1 et R'_2 , répondent à la formule (VI) ou groupe a2



10

ou

- R_2 et R_3 et/ou R'_2 et R'_3 répondent à la formule (VII) ou groupe a3



Dans un sous-groupe répondant à la formule (VI), R_1 et R_2 et/ou R'_1 et R'_2 forment ensemble un groupe $-O-CO-$, $O-SO-$, $O-CS$, $S-CO$ ou $-S-CS$, et R_3 et/ou R'_3 représentent un atome d'hydrogène.


Dans un autre sous-groupe répondant à la formule (VI), R_1 et R_2 , et/ou R'_1 et R'_2 représentent un groupe alkylène éventuellement ramifié et R_3 et/ou R'_3 représentent $-CO-O-alkyl$ (ou aryl), $-CO-O-CH_2-aryl$, $CO-O-CH(alkyl)-O-CO-alkyl$, $PO(O-alkyl$ ou $-aryl)_2$, alkyl ou H.

Dans un sous-groupe répondant à la formule (VII),

R_1 et/ou R'_1 représentent un atome d'hydrogène, et

R_2 et R_3 , et/ou R'_2 et/ou R'_3 représentent un groupe $-(CH_2)_p-$.


Un autre groupe préféré de la famille A, ou groupe a4, correspond au cas où R_2 et R_3 et/ou R'_2 et R'_3 forment un même substituant et forment ensemble avec R_1 ou respectivement R'_1 un bis-oxadiazole de formule (VIII).



dans laquelle R_a est tel que défini ci-dessus.


Dans des composés préférés de ce groupe, l'halogène est avantageusement F ou Cl, l'alkyle est un méthyle ou un éthyle, l'aryle est un phényle.

Une autre famille préférée de l'invention, ou famille B, répond à la formule (IX)



Dans des composés avantageux de cette famille,

$Z = -(CH_2)_m$ et $n = 0$, les composés répondant à la formule (X)




- 5 Dans un groupe préféré de la famille B, ou groupe b1, les substituants sont indépendants les uns des autres.

Dans un sous-groupe, R_1 et R_4 et/ou R'_1 et R'_4 sont tels que définis ci-dessus et R_2 représente un atome d'hydrogène.

- Dans un autre sous-groupe, R_1 et R_4 et/ou R'_1 et R'_4 représentent ensemble un groupe
10 $-(CH_2)_p-$ où p est un entier de 3 à 5 et R_2 et R'_2 représentent H.

Dans encore un autre sous-groupe, R_1 et R'_1 représentent H et R_4 et R_2 et/ou R'_4 et R'_2 représentent ensemble un groupe $-(CH_2)_p-$ où p est un entier de 3 à 5.


Un autre sous-groupe répond à la formule (XI)



Des composés préférés des familles A et B sont donnés dans les tableaux 1 à

- 15 3 ci-après.

TABLEAU 1

Série A

| Composé | n | Z | R ₁ (= R' ₁) | R ₂ (= R' ₂) | R ₃ (= R' ₃) | PM |
|------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|-----|
| 1.0, 2HCl | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | H | 327 |
| 1.1 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | CO ₂ CH ₃ | 370 |
| 1.1, 2HCl | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | CO ₂ CH ₃ | 443 |
| 1.2 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | CO ₂ C ₂ H ₅ | 398 |
| 1.3 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | CO ₂ nC ₄ H ₉ | 454 |
| 1.4 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | CO ₂ isoC ₄ H ₉ | 454 |
| 1.5 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | CO ₂ CH ₂ C ₆ H ₅ | 522 |
| 1.6 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | CO ₂ CH ₂ pNO ₂ C ₆ H ₄ | 612 |
| 1.7 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | CO ₂ C ₆ H ₅ | 494 |
| 1.8 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | CO ₂ pFC ₆ H ₄ | 530 |
| 1.8, 2HCl | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | CO ₂ pFC ₆ H ₄ | 603 |
| 1.9 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | CO ₂ pMeOC ₆ H ₄ | 554 |
| 1.10 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | CO ₂ CH ₂ OCOCH ₃ | 486 |
| 1.11 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | CO ₂ CH(CH ₃)OCOCH ₃ | 514 |
| 1.12 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | PO(OC ₆ H ₅) ₂ | 718 |
| 1.13 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | PO(OC ₂ H ₅) ₂ | 526 |
| 1.14 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | PO(ONa) ₂ | 502 |
| 1.15 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OH | H | H | 286 |
| 1.15, 2HCl | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OH | H | H | 359 |
| 1.16 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCH ₃ | H | H | 314 |
| 1.17 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCOOCH ₂ CH ₃ | H | H | 430 |
| 1.18 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCOOCH ₃ | H | H | 402 |
| 1.19 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCOOCH ₂ CH ₃ | H | H | 526 |
| 1.20 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCOSCH ₃ | H | H | 434 |
| 1.21 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCOSCH ₂ CH ₃ | H | H | 462 |
| 1.22 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCOCH ₃ | H | H | 370 |
| 1.23 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCOC ₆ H ₅ | H | H | 494 |
| 1.24 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCONHCH ₂ CH ₃ | H | H | 428 |
| 1.25 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCONHC ₆ H ₅ | H | H | 524 |
| 1.26 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OPO(OCH ₂ CH ₃) ₂ | H | H | 558 |
| 1.27 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -O-CO- | | H | 338 |
| 1.28 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -O-SO- | | H | 378 |
| 1.29 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -O-CS- | | H | 370 |
| 1.30 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -S-CO- | | H | 370 |
| 1.31 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -S-CS- | | H | 402 |



| | | | | | |
|------------|---|-------------------------------------|---|--|-----|
| 2.0, 2HCl | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | -(CH ₂) ₄ - | 435 |
| 3.0 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | -(CH ₂) ₅ - | 390 |
| 4.0, 2HCl | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | CH ₃ | 383 |
| 5.0 | 0 | -(CH ₂) ₁₆ - | H | H | 382 |
| 6.0 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₂ - | H | 306 |
| 6.1 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₂ - | CO ₂ CH ₃ | 422 |
| 6.2 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₂ - | CO ₂ C ₂ H ₅ | 450 |
| 6.3 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₂ - | CO ₂ <i>n</i> C ₄ H ₉ | 506 |
| 6.4 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₂ - | CO ₂ <i>iso</i> C ₄ H ₉ | 506 |
| 6.5 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₂ - | CO ₂ CH ₂ C ₆ H ₅ | 574 |
| 6.6 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₂ - | CO ₂ CH ₂ pNO ₂ C ₆ H ₄ | 664 |
| 6.7 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₂ - | CO ₂ C ₆ H ₅ | 546 |
| 6.8 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₂ - | CO ₂ pFC ₆ H ₄ | 582 |
| 6.8, 2HCl | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₂ - | CO ₂ pFC ₆ H ₄ | 655 |
| 6.9 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₂ - | CO ₂ pMeOC ₆ H ₄ | 606 |
| 6.10 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₂ - | CO ₂ pNO ₂ C ₆ H ₄ | 636 |
| 6.11 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₂ - | CO ₂ CH ₂ OCOCH ₃ | 538 |
| 6.12 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₂ - | CO ₂ CH(CH ₃)OCOCH ₃ | 566 |
| 6.13 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₂ - | PO(OC ₆ H ₅) ₂ | 770 |
| 6.14 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₂ - | PO(OC ₂ H ₅) ₂ | 578 |
| 7.0, 2HCl | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₂ - | CH ₃ | 407 |
| 8.0, 2HCl | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₃ - | H | 407 |
| 9.0, 2HCl | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -CH(CH ₃)-CH ₂ - | H | 407 |
| 10.0, 2HCl | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -C(CH ₃) ₂ -CH ₂ - | H | 435 |
| 11.0, 2HCl | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - |  | H | 487 |
| 12.0, 2HBr | 1 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | H | 446 |
| 12.1 | 1 | -(CH ₂) ₁₂ - | CO ₂ CH ₂ C ₆ H ₅ | CO ₂ CH ₂ C ₆ H ₅ | 820 |
| 12.2 | 1 | -(CH ₂) ₁₂ - | CO ₂ C(CH ₃) ₃ | CO ₂ C(CH ₃) ₃ | 684 |
| 13.0, 2HI | 1 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | CH ₃ | 370 |
| 14.0, 2HCl | 1 | -(CH ₂) ₁₂ - | C ₆ H ₁₁ | C ₆ H ₁₁ | 685 |
| 15.0, 2HBr | 1 | -(CH ₂) ₁₂ - | -CH ₂ -CH ₂ - | H | 500 |
| 16.0, 2HI | 1 | -(CH ₂) ₁₂ - | -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ - | H | 364 |
| 17.0, 2HI | 1 | -(CH ₂) ₁₂ - | -CH ₂ -C(CH ₃) ₂ -CH ₂ - | H | 676 |


TABLEAU 2




| Composé | R _n | PM |
|---------|---|-----|
| 18.0 | H | 306 |
| 18.1 | CH ₃ | 334 |
| 18.2 | CHF ₂ | 406 |
| 18.3 | CHCl ₂ | 472 |
| 18.4 | CF ₃ | 442 |
| 18.5 | CCl ₃ | 541 |
| 18.6 | C ₆ H ₅ | 458 |
| 18.7 | CO ₂ C ₆ H ₅ | 450 |
| 18.8 | CO ₂ H | 394 |
| 18.9 | CONH ₂ | 392 |
| 18.10 | CN | 356 |
| 18.11 | CONHCH ₃ | 420 |
| 18.12 | CON(CH ₃) ₂ | 448 |
| 18.13 | CONC ₄ H ₉ | 500 |
| 18.14 | CONC ₅ H ₁₁ | 528 |
| 18.15 | CONC ₄ H ₉ O | 532 |
| 18.16 | CONC ₄ H ₉ NH | 530 |
| 18.17 | CONC ₄ H ₉ NCH ₃ | 558 |
| 18.18 | NH ₂ | 336 |
| 18.19 | NHCH ₃ | 364 |
| 18.20 | N(CH ₃) ₂ | 392 |
| 18.21 | NC ₄ H ₉ | 444 |
| 18.22 | NC ₅ H ₁₁ | 472 |
| 18.23 | NC ₄ H ₉ O | 476 |
| 18.24 | NC ₄ H ₉ NH | 474 |
| 18.25 | NC ₄ H ₉ NCH ₃ | 502 |
| 18.26 | OCH ₃ | 366 |
| 18.27 | OC ₂ H ₅ | 394 |
| 18.28 | OCH ₂ C ₆ H ₅ | 518 |
| 18.29 | CH ₂ NH ₂ | 364 |
| 18.30 | CH ₂ NHCH ₃ | 392 |
| 18.31 | CH ₂ N(CH ₃) ₂ | 420 |
| 18.32 | CH ₂ NC ₄ H ₉ | 472 |
| 18.33 | CH ₂ NC ₅ H ₁₁ | 500 |
| 18.34 | CH ₂ NC ₄ H ₉ O | 504 |
| 18.35 | CH ₂ NC ₄ H ₉ NH | 502 |
| 18.36 | CH ₂ NC ₄ H ₉ NCH ₃ | 530 |
| 18.37 | CH ₂ NHCOCH ₃ | 448 |
| 18.38 | CH ₂ NHCOOCH ₃ | 480 |
| 18.39 | CH ₂ NHCOOC ₆ H ₅ | 604 |
| 18.40 | CH ₂ COOH | 422 |

TABLEAU 3

Série B



| Composé | n | Z | R ₁ (= R' ₁) | R ₄ (= R' ₄) | R ₂ (= R' ₂) | PM |
|------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 20.0 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | CH ₃ | H | 282 |
| 20.1 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OH | CH ₃ | H | 298 |
| 20.2 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCH ₃ | CH ₃ | H | 312 |
| 20.3 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCOOCH ₂ CH ₃ | CH ₃ | H | 370 |
| 20.4 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCOOCH ₃ | CH ₃ | H | 356 |
| 20.5 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCOC ₆ H ₅ | CH ₃ | H | 418 |
| 20.6 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCOSCH ₃ | CH ₃ | H | 372 |
| 20.7 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCOSCH ₂ CH ₃ | CH ₃ | H | 386 |
| 20.8 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCOCH ₃ | CH ₃ | H | 340 |
| 20.9 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCOC ₆ H ₅ | CH ₃ | H | 402 |
| 20.10 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCONHCH ₂ CH ₃ | CH ₃ | H | 369 |
| 20.11 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | OCONHC ₆ H ₅ | CH ₃ | H | 417 |
| 21.0 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₃ - | | H | 334 |
| 22.0, 2HCl | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₄ - | | H | 435 |
| 23.0 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | -(CH ₂) ₅ - | | H | 390 |
| 24.0 | 0 | -(CH ₂) ₁₂ - | H | -(CH ₂) ₃ - | | 334 |
| 25.0, 2TFA | | |  | | | 605 |

Les composés selon l'invention se présentent le cas échéant sous forme de sels. On citera à titre d'exemples les chlorhydrates, les citrates, les tartrates, les maléates, les lactates, les acétates et trifluoroacétates.

Conformément à l'invention les carbamates et les dérivés N-phosphorylés de formule générale (V) et (VI) définis ci-dessus peuvent être obtenus par un procédé caractérisé en ce qu'il comprend la réaction en milieu diphasique des composés bisamidines de formule générale (V) et (VI) dans lesquels R₃ et R'₃ = H avec un dérivé Cl-R₃ (ou R'₃) où R₃ et R'₃ sont tels que définis ci-dessus et différents de H comme illustré dans les exemples.

Les dérivés d'amidoxime de formule générale (V) et (X) définis ci-dessus peuvent être obtenus par un procédé caractérisé en ce qu'il comprend la réaction en milieu basique des bisamidoximes de formules générale (V) et (X) dans lesquels R_1 et $R'_1 = OH$ et du réactif approprié comme illustré dans les exemples.

5 De manière avantageuse des composés de formule générale (VI) groupe a2 et (VIII) groupe a4 définis ci-dessus peuvent être obtenus par cyclisation intramoléculaire d'amidoxime ou de dérivés d'amidoxime précédemment définis de formule générale (V) groupe a1 en présence du réactif approprié comme illustré dans les exemples.

10 L'étude de l'activité des produits de l'invention vis-à-vis de parasites, et notamment de *Plasmodium*, a montré qu'ils présentent une forte activité *in vitro*.

Ainsi, les valeurs de CI_{50} (concentration inhibant 50% du parasite) sont de l'ordre du nM au μM vis-à-vis de *P. falciparum*.

15 L'invention vise donc la mise à profit des propriétés des composés pour l'élaboration de compositions pharmaceutiques.

Les compositions pharmaceutiques de l'invention sont caractérisées en ce qu'elles renferment une quantité efficace d'au moins un composé tel que défini ci-dessus, en association avec un véhicule pharmaceutique inerte.

20 L'invention vise également l'utilisation d'au moins l'un desdits composés pour fabriquer des médicaments pour le traitement de maladies infectieuses, en particulier du paludisme.

Ces compositions renferment le cas échéant des principes actifs d'autres médicaments. On citera notamment leur association avec d'autres antipaludiques (tels que les agents lysosomotropes, l'atovaquone, les antifoliques ou

antifoliniques, ou l'artémisinine ou l'un de ses dérivés) pour raison de synergie pharmacologique ou d'évitement de résistance.

On les utilisera également avec avantage en association avec des composés facilitant leur assimilation.

5 Les compositions pharmaceutiques de l'invention sont administrables sous différentes formes, plus spécialement par voie orale ou injectable ou encore par voie rectale.

Pour l'administration par voie orale, on a recours en particulier à des comprimés, pilules, tablettes, gélules, gouttes.

10 D'autres formes d'administration comprennent des solutions injectables par voie intra-veineuse, sous-cutanée ou intra-musculaire, élaborées à partir de solutions stériles ou stérilisables. Il peut s'agir également de suspensions ou d'émulsions.

15 On peut également utiliser des suppositoires pour d'autres formes d'administration.

Les compositions de l'invention sont particulièrement appropriées pour le traitement des maladies infectieuses chez l'homme et l'animal, en particulier du paludisme ou des babésioses.

20 A titre indicatif, la posologie utilisable chez l'homme correspond aux doses suivantes : ainsi on administre par exemple au patient de 1 à 90 mg/kg en une ou plusieurs prises.

L'invention vise encore les réactifs biologiques renfermant comme principes actifs, les composés définis plus haut.

25 Ces réactifs peuvent être utilisés comme références ou étalons dans des études d'éventuelles activités anti-parasitaires.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront dans les exemples qui suivent relatifs à la synthèse des composés et à l'étude de leur activité anti-parasitaire. Dans ces exemples, il sera fait référence à la figure 1, qui représente l'activité antipaludique du composé 6.0 en fonction de la concentration en
 5 drogue, selon le test de Desjardins, (Desjardins R.E. et al, Antimicrob. Agents Chemother. 1979, 16, 710-718).

Exemple 1 :

Intermédiaires de synthèse

1,12-dicyanododécane:

10 Une suspension sous agitation vive de 3.3 g (67.10 mmol) de cyanure de sodium dans 30 ml de diméthylsulfoxyde est chauffée entre 90 et 95°C jusqu'à dissolution complète. A la solution obtenue et refroidie à température inférieure à 50°C, sont ajoutés en très petites portions et lentement 10 g (30.49 mmol) de 1,12-dibromododécane. Après 2 H d'agitation à température ambiante la suspension
 15 obtenue, est dissoute par addition de 90 ml de dichlorométhane et lavée plusieurs fois par une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium. Après quoi, la phase organique séchée sur sulfate de sodium, est évaporée sous pression réduite. Le résidu huileux froid repris dans de l'éther puis évaporé à sec, se cristallise et donne 6.44 g (96 %) de cristaux blancs.

20 Point de fusion : < 40° C

RMN ¹H (CDCl₃, 100 MHz), δ (ppm): 1.24 (s, 16H); 1.60 (m, 4H); 2.31 (t, 4H)

FT-IR, ν (cm⁻¹) : 2246 (CN)

Dichlorhydrate de diéthyltétradécane-diimidoate:

Dans une solution refroidie à 0°C, de 20 ml d'éthanol anhydre, 60 ml d'éther anhydre et de 5 g (22.73 mmol) de 1,12-dicyanododécane, faire barboter pendant 2H de l'acide chlorhydrique gaz puis, laisser le mélange réactionnel sous agitation toute une nuit. Après quoi, les solvants sont évaporés sous pression réduite. Le résidu
 5 solide obtenu est cristallisé et lavé plusieurs fois à l'éther puis séché au dessiccateur. On obtient 7.7 g (82%) d'une poudre blanche.

Point de fusion : 118-120°C

RMN ¹H (DMSO-d₆, 100 MHz), δ (ppm): 1.26 (s, 16H); 1.35 (t, 6H); 1.60 (m, 4H); 2.63 (t, 4H); 4.55 (q, 4H); 11.16 et 12.08 (2s, 4H)

10 FT-IR, ν (cm⁻¹) : 1097 (C-O); 1651.50 (C=N); 3032 et 3118 (NH₂,Cl)

***N,N'*-di-benzyloxycarbonyl-S-méthylisothiourée:**

A une solution de 1 g (3.60 mmol) de sulfate de S-méthylisothiourée dans 40 ml d'un mélange diphasique dichlorométhane/solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium(1:1), sous agitation vive, sont additionnés goutte à goutte 2 ml
 15 (14.4 mol) de chloroformiate de benzyle. L'agitation est maintenue à température ambiante pendant 25 H. Après quoi, la phase aqueuse est extraite 3 fois avec du dichlorométhane. Les phases organiques réunies, sont ensuite lavées avec de l'eau puis séchées sur sulfate de sodium et évaporées sous pression réduite. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur colonne de silice (DCM) pour donner 1.06
 20 g (82%) de produit sous forme d'une huile jaune.

RMN ¹H (CDCl₃, 100 MHz), δ (ppm): 2.46 (s, 3H); 5.24 (s, 4H); 7.42 (s, 10H); 11.91 (s, 1H)

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1022 et 1173 (C-O); 1647 (C=N); 1751 (NCO); 3169 (NHCO)

***N,N'*-di-*tert*-butyloxycarbonyl-S-méthylisothiourée:**

Une solution diphasique (100 ml) de DCM/ NaHCO_3 aqueux saturé contenant 5.81 g (26.60 mmol) de di-*tert*-butylcarbonate et de 2.53 g (18.20 mmol) d'hémisulfate de S-méthylisothiourée est laissée sous agitation vive durant 48 heures. Après quoi, la phase aqueuse séparée, est extraite avec 2 X 100 ml de DCM. Les phases organiques réunies sont ensuite lavées avec 2 X 200 ml d'eau puis évaporées sous pression réduite. Le résidu est par suite repris avec 100 ml du mélange diphasique DCM/ NaHCO_3 aqueux saturé auquel on ajoute 0.55 g (3.85 mmol) d'hémisulfate de S-méthylisothiourée. Le mélange réactionnel est encore laissé sous agitation vive durant 72 heures. Les phases organiques réunies après le même traitement que précédemment, sont séchées sur sulfate de sodium et évaporées sous pression réduite. Le résidu est finalement purifié sur silice (Hexane/ CHCl_3 5% puis CHCl_3) pour conduire à 3.46 g (90%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion : 123- 124 °C

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.49 (s, 18H); 2.38 (s, 3H); 11.60 (s, 1H)

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1043 et 1252 (C-O); 1667 (C=N); 1765 (NCO); 3337 (NHCO)

O-chlorométhyl-S-éthyl carbonothioate:

A une solution sous agitation et refroidie entre 0 et 5°C de 44 ml (500 mmol) de chlorométhyl chloroformiate dans 900 ml d'éther, est additionnée goutte à goutte durant 2 heures, une solution de 37 ml (500 mmol) d'éthanethiol et 69.3 ml (500

mmol) de triéthylamine dans 200 ml d'éther. Après quoi, les conditions opératoires sont maintenues pendant 30 minutes. Le mélange réactionnel est ensuite laissé sous agitation durant 16 heures à température ambiante puis le précipité formé est filtré et lavé avec de l'éther. Les phases étherées réunies sont évaporées et le résidu purifié par distillation pour donner 57 g (73%) de produit sous forme de liquide.

Point d'ébullition : 99-100°C / 18 mbar

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.30 (t, 3H); 2.89 (q, 2H); 5.73 (s, 2H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1719 (S-CO-O).

S-éthyl-O-iodométhyl carbonothioate:

A une solution sous agitation de 106.8 g (712 mmol) d'iodure de sodium et 3 g (35.6 mmol) de bicarbonate de sodium dans 450 ml d'acétone, sont ajoutés directement 55 g (356 mmol) de O-chlorométhyl-S-éthyl carbonothioate. Le mélange réactionnel est ensuite laissé sous agitation et à 40°C durant 4 heures. Le précipité formé est filtré et lavé avec de l'acétone et de l'éther. La phase organique est évaporée et le résidu est partagé entre 1100 ml d'hexane refroidi à 0°C et 500 ml d'eau froide. La phase organique séparée, est ensuite lavée successivement avec 200 ml de bicarbonate de sodium aqueux à 5%, 200 ml de thiosulfate de sodium aqueux à 1% (jusqu'à décoloration de la solution) et 2 X 200 ml d'eau. Après séchage de la phase hexanique sur sulfate de sodium et évaporation sous pression réduite, 81 g (92%) de produit sont obtenus sous forme de liquide jaunâtre sans purification.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.30 (t, 3H); 2.89 (q, 2H); 5.96 (s, 2H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1715 (S-C-O).

O-acétyloxyméthyl-S-éthyl carbonothioate:

A une solution sous agitation et refroidie à -20°C de 26.7 g (325.2 mmol) d'acétate de sodium dans 420 ml de diméthylformamide anhydre, sont additionnés goutte à goutte durant 2 heures 80 g (325.2 mmol) de S-éthyl-O-iodométhyl carbonothioate. Le mélange réactionnel est ensuite laissé sous agitation durant 16 heures à température ambiante puis le précipité formé est filtré et lavé avec 20 ml de diméthylformamide et 40 ml d'éther. A la phase organique dans une ampoule à décanter, est ajouté 850 ml d'éther et 350 ml d'eau froide. La phase aqueuse est isolée et extraite avec 350 ml d'eau. Les phases étherées réunies sont ensuite lavées successivement avec 220 ml de bicarbonate de sodium aqueux à 5%, 220 ml d'eau, 2 X 220 ml d'acide chlorhydrique 0.01 N et 220 ml d'eau. Après séchage de la phase organique sur sulfate de sodium et évaporation, le résidu est purifié par distillation pour donner 35 g (60%) de produit sous forme de liquide jaunâtre.

Point d'ébullition : 82-83°C / 0.25 mbar

RMN ¹H (CDCl₃, 100 MHz) , δ (ppm): 1.30 (t, 3H); 2.09 (s, 3H); 2.87 (q, 2H); 5.76 (s, 2H).

FT-IR, ν (cm⁻¹) : 1717 (S-CO-O); 1767 (CO-O).

acétyloxyméthyl chloroformiate:

A la solution de 33 g (185.4 mmol) de O-acétyloxyméthyl-S-éthyl carbonothioate sous agitation et refroidie entre 0-5°C, sont ajoutés 14.90 ml (185.4 mmol) de chlorure de sulfuryle. Les conditions opératoires sont maintenues pendant 15 minutes puis le mélange réactionnel est laissé sous agitation durant 45 minutes à

température ambiante. La solution de chlorure de S-éthyle formée est évaporée à température ambiante puis à 20 mbar toute une nuit. Le résidu obtenu est ensuite purifié par distillation pour donner 15.50 g (56%) de produit sous forme de liquide orange.

5 Point d'ébullition : 75-76°C / 17 mbar

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 2.12 (s, 3H); 5.76 (s, 2H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1724 (CO-O); 1773 (Cl-CO).

3,4-dihydro-5-méthoxy-2H-pyrrole:

10 A la solution de 20,03 g (0,235 mol) de pyrrolidine-2-one dans 85 ml de benzène, chauffée à 70°C sont additionnés goutte à goutte 23 ml (1 équivalent) de diméthylsulfate. Ce mélange réactionnel est chauffé à reflux pendant 3 h.. Après refroidissement à température ambiante, 19 ml d'une solution de soude 15N sont ajoutés au mélange réactionnel. Celui-ci est versé dans une ampoule à décanter, et la phase aqueuse est extraite 3 fois avec du benzène. Les phases organiques réunies sont

15 séchées sur sulfate de sodium et évaporées sous pression réduite. Le résidu est distillé sous vide pour donner le produit, liquide incolore, avec un rendement de 58%.

Point d'ébullition : 37°C sous 10^{-2} mbar

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm) : 1,97 (m, 2H) ; 2,41 (t, 2H) ; 3,61 (t, 2H) ; 3,75 (s, 3H)

20 **Iodure de 2-méthylsulfanyl-3,4,5,6-tétrahydropyrimidinium:**

Le mélange réactionnel composé d'un équivalent de 3,4,5,6-tétrahydro(1H)pyrimidine-2-thione et 1,2 équivalents de iodométhane dans du

méthanol (10 ml/g de thio-urée) est chauffé à reflux pendant 5 heures. Après refroidissement, le méthanol est évaporé sous pression réduite pour donner quantitativement le produit. Le précipité peut ensuite être lavé dans de l'acétone ou de l'éther de pétrole.

5 Point de fusion : 146-148°C

RMN ^1H (DMSO- d_6 , 100 MHz) : 1,94 (m, 2H) ; 2,66 (s, 3H) ; 3,44 (t, 4H) ; 9,53 (s, 2H) ppm.

5,5-Diméthyl-3,4,5,6-tétrahydro(1*H*)pyrimidine-2-thione:

Dans un ballon de 250 ml, 10 ml (167, 2 mmol ; 2 éq.) de disulfure de
10 carbone sont additionnés à la solution de 10 ml (83,6 mmol) de 2,2-diméthyl-1,3-diaminopropane dans 50 ml d'éthanol absolu. Puis, 16,02 g (83,6 mmol) d'EDC sont ajoutés au mélange réactionnel, qui est agité 3 heures à température ambiante. L'éthanol est évaporé, le résidu est repris avec de l'eau et extrait au dichlorométhane. Après séchage sur Na_2SO_4 et évaporation de la phase organique on obtient 11,2 g
15 (93%) de produit (poudre blanche), utilisée sans purification supplémentaire.

Point de fusion : 225-228°C

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz) : 0,91 (s, 6H) ; 2,88 (d, 4H) ; 7,46 (s, 2H) ppm.

Iodhydrate de 5,5-diméthyl-2-méthylsulfanyl-3,4,5,6-tétrahdropyrimidinium:

20 Le mélange réactionnel composé d'un équivalent de 5,5-diméthyl-3,4,5,6-tétrahydro(1*H*)pyrimidine-2-thione et 1,2 équivalents de iodométhane dans du méthanol (10 ml/g de thio-urée) est chauffé à reflux pendant 5 heures. Après

refroidissement, le méthanol est évaporé sous pression réduite pour donner quantitativement le produit. Le précipité peut ensuite être lavé dans de l'acétone ou de l'éther de pétrole.

.RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz): 0,95 (s, 6H); 2,62 (s, 3H); 3,11 (s, 4H), 8,76 (s, 2H)

5 ppm.

Chlorhydrate de 1-(*N*-tert-butyloxycarbonylamino)dodécane-12-ammonium:

Une solution de 4,02 g (18,4 mmol) de di-*tert*-butyldicarbonate dans 60 ml de dioxane est additionnée lentement, goutte à goutte (pendant environ deux heures), à une solution de 15,01 g (75 mmol, 4,1 éq.) de 1,12-dodécanediamine dans un
10 mélange dioxane/eau (150/70ml). Le mélange réactionnel est agité à température ambiante pendant 24 h, l'excès de diamine est filtré et les solvants sont évaporés sous pression réduite. Le résidu est repris avec une solution HCl 1*N* et du dichlorométhane. Le précipité formé dans la phase aqueuse est filtré pour donner le dérivé mono-Boc et un peu de diamine, tous deux sous forme de sel de chlorhydrate.
15 Ce solide est recristallisé avec de l'éthanol et de l'éther pour donner 4,56 g (74% de rendement) de sel de diamine mono-protégée, sous forme d'une poudre blanche.

Point de fusion : 153-155°C.

RMN ^1H (CD_3OD , 100 MHz), δ (ppm) : 1,28 (m, 20 H) ; 1,38 (s, 9H) ; 2,91 (m, 4H)

SM-FAB+ : $[\text{M}+\text{H}]^+$: 301

20 **Iodhydrate de [1-[*N*-(5, 5-diméthyl-3,4,5,6-tétrahydropyrimidin-2-yl)amino]-12-(*N'*-*tert*-butyloxycarbonylamino)]dodécane:**

A la suspension de 1,02 g (3 mmol) de chlorure de 12-(*N*-*tert*-butyloxycarbonylamino)dodécane-1-ammonium dans 15 ml d'acétonitrile sont

ajoutés 0,85 g (3 mmol) d'iodure 5,5-diméthyl-2-méthylsulfanyl-3,4,5,6-tétrahydropyrimidinium et 0,85 ml (2 éq.) de triéthylamine. Ce mélange réactionnel est chauffé à reflux pendant 24h. Après refroidissement à température ambiante, l'amine qui n'a pas réagi est filtrée. Le filtrat est évaporé sous pression réduite et chromatographié sur colonne de silice (éluant : CH₂Cl₂/CH₃OH/NH₄OH 80 :16 :4) pour donner 1,36 g (85%) de produit.

RMN ¹H (CD₃OD, 100 MHz), δ (ppm) : 1,07 (s, 6H) ; 1,37 (m, 29H) ; 3,05 (m, 8H).

Ditrifluoroacétate de 1-[N-(5,5-diméthyl-3,4,5,6-tétrahydropyrimidin-2-yl)amino]dodécane-12-ammonium:

1,06 g (2 mmol) d'iodhydrate de [1-[N-(5,5-diméthyl-3,4,5,6-tétrahydropyrimidin-2-yl)amino]-12-(*N'*-*tert*-butyloxycarbonylamino)]dodécane sont solubilisés dans 15 ml d'une solution TFA/CH₂Cl₂ (3/1). Cette solution est agitée 3 heures à température ambiante ; l'excès d'acide trifluoroacétique sont évaporés sous pression réduite pour donner quantitativement 0,98 g de produit.

RMN ¹H (DMSO-d₆, 100 MHz), δ (ppm) : 1,0 (s, 6H) ; 1,3 (m, 20H) ; 3,0 (m, 8H) ; 8,0 (sl, 2H) ; 9,0 (s, 3H).

SM-ES⁺ : [M+H]⁺ : 311 ; [M+2H]⁺⁺/2 : 156

Synthèses

Dichlorhydrate de 1,12-bis(amidinyl)dodécane: 1.0, 2HCl

Dans une solution refroidie par un bain de glace à température inférieure à 10°C, de 45 ml d'éthanol anhydre et de 5 g (13 mmol) de chlorhydrate de diéthyltétradécane-diimidoate, faire barboter pendant 2 heures, de l'ammoniac gaz. Après quoi, le solvant est évaporé sous pression réduite. Le résidu obtenu est

ensuite lavé plusieurs fois avec de l'éther et séché au dessiccateur. On obtient 3,53 g (83%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 170-172°C

RMN ^1H (DMSO- d_6 , 100 MHz), δ (ppm): 1,25 (s, 16H); 1,58 (m, 4H); 2,37 (t, 4H); 8,82 (s, 4H); 9,10 (s, 4H)

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1688 (C=N); 3081 (NH_2 ,Cl); 3245 (NH_2)

1,12-bis[*N,N'*-(méthylloxycarbonyl)amidinyl]dodécane: 1.1

A une solution de 1 g (3.06 mmol) de dichlorhydrate de 1,12-bis(amidinyl)dodécane dans 60 ml d'un mélange diphasique dioxane/eau (3:1) et refroidie par un bain de glace, sont ajoutés goutte à goutte et sous agitation vive, 0,60 ml (7,65 mmol) de chloroformiate de méthyle tout en maintenant le pH du mélange entre 10 et 12 avec une solution aqueuse de soude 4N. Le mélange est ensuite laissé sous agitation et à température ambiante durant 3 heures. Après quoi, 100 ml d'eau sont additionnés. Le précipité formé est ensuite essoré, lavé plusieurs fois à l'eau puis à l'éther pour conduire après séchage au dessiccateur, à 1,30 g (77%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 116-117°C.

RMN ^1H (DMSO- d_6 , 100 MHz), δ (ppm): 1,69 (s, 16H); 1,96 (m, 4H); 2,61 (t, 4H); 3,97 (s, 6H); 9,06 (s, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1256 (C-O-C); 1633 (C=N); 1670 (NHCO); 3183 (NHCO); 3343 (NH)

SM-ES+: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 371

1,12-bis[*N,N'*-(éthylloxycarbonyl)amidinyl]dodécane: 1.2

A une solution de 1 g (3,06 mmol) de dichlorhydrate de 1,12-bis(amidinyl)dodécane dans 60 ml d'un mélange diphasique dioxane/eau (3:1) et refroidie par un bain de glace, sont ajoutés goutte à goutte et sous agitation vive, 0,73 ml (7,65 mmol) de chloroformiate d'éthyle tout en maintenant le pH du mélange entre 10 et 12 avec une solution aqueuse de soude 4N. Le mélange est ensuite laissé sous agitation et à température ambiante durant 3 heures. Après quoi, 100 ml d'eau sont additionnés. Le précipité formé est ensuite essoré, lavé plusieurs fois à l'eau puis à l'éther pour conduire après séchage au dessiccateur, à 0.98 g (80%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 95-96°C.

RMN ¹H (DMSO-d₆, 100 MHz), δ (ppm): 1.63 (t, 6H); 1.71 (m, 16H); 1.93 (m, 4H); 2.63 (t, 4H); 4.49 (q, 4H); 8.95 et 9.12 (2s, 4H).

FT-IR, ν (cm⁻¹) : 1251 (C-O-C); 1667 (C=N); 1757 (CO); 3186 (NHCO); 3330 (NH)

SM-ES+: [M+H]⁺: 399; [M+2H]²⁺/2 : 200 (100%)

1,12-bis[*N,N'*-(butyloxycarbonyl)amidinyl]dodécane: 1.3

A une solution de 1 g (3,06 mmol) de dichlorhydrate de 1,12-bis(amidinyl)dodécane dans 60 ml d'un mélange diphasique dioxane/eau (3:1) et refroidie par un bain de glace, sont ajoutés goutte à goutte et sous agitation vive, 0,99 ml (7,65 mmol) de chloroformiate de butyle tout en maintenant le pH du

mélange entre 10 et 12 avec une solution aqueuse de soude 4N. Le mélange est ensuite laissé sous agitation et à température ambiante pendant 3 heures. Après quoi, 100 ml d'eau sont additionnés. Le précipité formé est ensuite essoré, lavé plusieurs fois à l'eau puis à l'éther pour conduire après séchage au dessiccateur, à 1.12 g (80%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 87-88°C.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 0.88 (t, 6H); 1.21 (s, 16H) 1.48 - 1.70 (m, 8H); 1.88 (m, 4H); 2.24 (t, 4H); 4.03 (t, 4H); 6.21 (s, 2H); 9.24 (s, 2H).

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1084 et 1234 (C-O-C); 1594 (C=N); 1660 (CO); 3313 (NHCO); 3441 (NH)

SM-ES+: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 455

1,12-bis[*N,N'*-(isobutyloxycarbonyl)amidinyl]dodécane: 1.4

A une solution de 1 g (3.06 mmol) de dichlorhydrate de 1,12-bis(amidinyl)dodécane dans 60 ml d'un mélange diphasique dioxane/eau (3:1) et refroidie par un bain de glace, sont ajoutés goutte à goutte et sous agitation vive, 1 ml (7.65 mmol) de chloroformiate d'isobutyle tout en maintenant le pH du mélange entre 10 et 12 avec une solution aqueuse de soude 4N. Le mélange est ensuite laissé sous agitation et à température ambiante pendant 3 heures. Après quoi, 100 ml d'eau sont additionnés. Le précipité formé est ensuite essoré, lavé plusieurs fois à l'eau puis à l'éther pour conduire après séchage au dessiccateur, à 1.27 g (91%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 102-103°C.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 0.92 (d, 12H); 1.22 (s, 16H) 1.62 (m, 4H); 1.96 (m, 2H); 2.26 (t, 4H); 3.82 (d, 4H); 6.19 (s, 2H); 9.27 (s, 2H).

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1069 et 1237 (C-O-C); 1599 (C=N); 1661 (CO); 3314 (NHCO); 3440 (NH)

5 SM-ES+: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 455

1,12-bis[*N,N'*-(benzyloxycarbonyl)amidinyl]dodécane: 1.5

A une solution de 1 g (3.06 mmol) de dichlorhydrate de 1,12-bis(amidinyl)dodécane dans 60 ml d'un mélange diphasique dioxane/eau (3:1) et refroidie par un bain de glace, sont ajoutés goutte à goutte et sous agitation vive, 1.1
10 ml (7.65 mmol) de chloroformiate de benzyle tout en maintenant le pH du mélange entre 10 et 12 avec une solution aqueuse de soude 4N. Le mélange est ensuite laissé sous agitation et à température ambiante toute une nuit. Après quoi, 100 ml d'eau sont additionnés. Le précipité formé est ensuite essoré, lavé plusieurs fois à l'eau puis à l'éther pour conduire après séchage au dessiccateur, à 1.2 g (75%) de produit
15 sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 118-119°C.

RMN ^1H ($\text{DMSO}-d_6$, 100 MHz), δ (ppm): 1.19 (s, 16H); 1.47 (m, 4H); 2.13 (t, H); 4.96 (s, 4H); 7.30 (s, 10H); 8.29 (s, 2H); 8.50 (s, 2H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 693 et 745 (C-H aromatique); 1236 (C-O-C); 1648 (C=N); 1666
20 (CO); 3311 (NHCO); 3436 (NH)

SM-ES+: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 523; $[\text{M}+2\text{H}]^{2+} / 2$: 262 (100%)

1,12-bis[*N,N'*-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)amidinyl]dodécane: 1.6

A une solution de 1 g (3.06 mmol) de dichlorhydrate de 1,12-bis(amidinyl)dodécane dans 60 ml d'un mélange diphasique dioxane/eau (3:1) et refroidie par un bain de glace, sont ajoutés goutte à goutte et sous agitation vive, 1.65 g (7.65 mmol) de chloroformiate de 4-nitrobenzyle en solution dans 5 ml de dioxane. Le pH de la solution est maintenu entre 10 et 12 avec une solution aqueuse de soude 4N. Le mélange est ensuite laissé sous agitation et à température ambiante toute une nuit. Après quoi, 100 ml d'eau sont additionnés. Le précipité formé est ensuite essoré, lavé plusieurs fois à l'eau puis à l'éther pour conduire après séchage au dessiccateur, à 1.37 g (74%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 87-88°C.

RMN ^1H (DMSO- d_6 , 100 MHz), δ (ppm): 1.22 (s, 16H); 1.51 (m, 4H); 2.18 (t, 4H); 5.15 (s, 4H); 7.59 (dd, 4H); 8.23 (dd, 4H); 8.69 (s, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1248 (C-O-C); 1344 et 1512 (NO_2); 1621 (C=N); 1658 (CO); 3316 (NHCO); 3406 (NH)

SM-ES+: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 623

1,12-bis[*N,N'*-(phényloxycarbonyl)amidinyl]dodécane: 1.7

A une solution de 1.5 g (4.59 mmol) de dichlorhydrate de 1,12-bis(amidinyl)dodécane dans 80 ml d'un mélange diphasique dioxane/eau (3:1) et refroidie par un bain de glace, sont ajoutés goutte à goutte et sous agitation vive, 1.44 ml (11.47 mmol) de phényl chloroformiate tout en maintenant le pH du

mélange entre 10 et 12 avec une solution aqueuse de soude 2N. Le mélange est ensuite laissé sous agitation et à température ambiante durant 3 heures. Après quoi, 150 ml d'eau sont additionnés et la solution extraite avec 3 X 60 ml de DCM. La phase organique est ensuite lavée plusieurs fois à l'eau puis évaporée sous pression
 5 réduite. On obtient 1.77 g (78%) de produit sous forme liquide.

RMN ^1H (DMSO- d_6 , 100 MHz), δ (ppm): 1.73 (s, 16H); 2.05 (m, 4H); 2.72 (t, 4H); 7.17 – 7.90 (m, 10H); 9.20 (s, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1623 (C=N); 1682 (COO); 3378 (NH et NHCO)

SM-ES+: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 495

10 **1,12-bis[*N,N'*-(4-fluorophényloxy-carbonyl)amidinyl]dodécane: 1.8**

A une solution de 1.5 g (4.59 mmol) de dichlorhydrate de 1,12-bis(amidinyl)dodécane dans 80 ml d'un mélange diphasique dioxane/eau (3:1) et refroidie par un bain de glace, sont ajoutés goutte à goutte et sous agitation vive, 1.50 ml (11.47 mmol) de 4-fluorophényl chloroformiate tout en maintenant le pH du
 15 mélange entre 10 et 12 avec une solution aqueuse de soude 2N. Le mélange est ensuite laissé sous agitation et à température ambiante durant 3 heures. Après quoi, 150 ml d'eau sont additionnés. Le précipité formé est ensuite essoré, lavé plusieurs fois à l'eau puis à l'éther pour conduire après séchage au dessiccateur, à 1.55 g (64%) de produit sous forme de poudre blanche.

20 Point de fusion: $^{\circ}\text{C}$.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.26 (s, 16H) ; 1.70 (m, 4H); 2.35 (t, 4H); 6.62 – 7.14 (m, 8H); 6.20 (s, 2H); 9.23 (s, 2H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1177 (C-O-C); 1253 (C-F); 1622 (C=N); 1679 (COO); 3327 (NH et NHCO)

SM-ES+: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 531

Dichlorhydrate de **1,12-bis[*N,N'*-(4-fluorophényloxy-carbonyl)amidinyl]dodécane: 1.8, 2HCl**

Dans 20 ml d'une solution éthanolique saturée en acide chlorhydrique gaz, est ajouté 1 g de 1.8. Le mélange réactionnel sous agitation vive est ensuite chauffé à 50°C durant 2 heures. A la solution froide sont additionnés 150 ml d'éther puis le mélange est laissé au repos au réfrigérateur toute une nuit. Après décantation, la couche huileuse formée, est reprise avec 100 ml d'eau distillée puis filtrée. Le filtrat est finalement lyophilisé pour conduire au sel sous forme de poudre blanche.

RMN ^1H (DMSO- d_6 , 100 MHz), δ (ppm): 1.75 (s, 16H); 2.15 (m, 4H); 3.06 (t, 4H); 7.20 (s, 2H); 7.70 et 7.78 (d, 8H); 7.85 et 8.21 (2s, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1684 (C=N); 1753 (NCO); 3324 (NH, HCl).

1,12-bis[*N,N'*-(4-méthoxyphényloxy-carbonyl)amidinyl]dodécane: 1.9

A une solution de 1.5 g (4.59 mmol) de dichlorhydrate de 1,12-bis(amidinyl)dodécane dans 80 ml d'un mélange diphasique dioxane/eau (3:1) et refroidie par un bain de glace, sont ajoutés goutte à goutte et sous agitation vive, 1.70 (11.47 mmol) de 4-méthoxyphényl chloroformiate tout en maintenant le pH du mélange entre 10 et 12 avec une solution aqueuse de soude 2N. Le mélange est ensuite laissé sous agitation et à température ambiante durant 3 heures. Après quoi, 150 ml d'eau sont additionnés et la solution extraite avec 3 X 60 ml de DCM. La

phase organique est ensuite lavée plusieurs fois à l'eau puis évaporée sous pression réduite. On obtient 1.97 g (78%) de produit sous forme liquide.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.21 (s, 16H); 1.62 (m, 4H); 2.28 (t, 4H); 3.73 (s, 6H); 6.71 – 7.06 (m, 8H); 6.18 (s, 2H); 9.21 (s, 2H).

5 FT-IR, ν (cm^{-1}): 1176 et 1189 (C-O-C); 1504 (C-H aromatique); 1623 (C=N); 1678 (COO); 3374 (NH et NHCO)

SM-ES+: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 555

[1,12-bis(amidinyl)dodécane]-1,12-bis-*N,N'*-phosphonate de diphényle:
1.12

10 A une solution de 1.5 g (4.59 mmol) de dichlorhydrate de 1,12-bis(amidinyl)dodécane dans 30 ml d'un mélange diphasique dioxane/eau (3:1) et refroidie par un bain de glace, sont ajoutés goutte à goutte et sous agitation vive, 2.85 ml (13.76 mmol) de diphénylchlorophosphonate tout en maintenant le pH du mélange entre 10 et 12 avec une solution aqueuse de soude 4N. Le mélange est
15 ensuite laissé sous agitation et à température ambiante pendant 3h. Après quoi, 50 ml d'eau sont additionnés. Le précipité formé est ensuite essoré, lavé plusieurs fois à l'eau puis à l'éther pour conduire après séchage au dessiccateur, à 2.70 g (82%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 100-101°C

20 RMN ^1H ($\text{DMSO}-d_6$, 100 MHz), δ (ppm): 1.65 (s, 16H); 1.93 (m, 4H); 2.79 (t, 4H); 7.68 - 7.81 (m, 20H); 8.31 (s, 2H); 8.71 (s, 2H)

RMN ^{31}P ($\text{DMSO}-d_6$, 81 MHz), δ (ppm): -1.64

FT-IR, ν (cm^{-1}): 935 (P=O); 1230 (C-O); 1675 (C=N); 3169 (NHPO); 3324 (N-H)

SM-FAB+: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 719; $[\text{M}+2\text{H}]^{++}/2$: 360 (100%)

[1,12-bis(amidinyl)dodécane]-1,12-bis-*N,N'*-phosphonate de diéthyle: 1.13

A une solution de 1 g (3.06 mmol) de dichlorhydrate de 1,12-bis(amidinyl)dodécane dans 40 ml d'un mélange diphasique dioxane/eau (3:1) et refroidie par un bain de glace, sont ajoutés goutte à goutte et sous agitation vive, 1.11 ml (7.65 mmol) de diéthylchlorophosphonate tout en maintenant le pH du mélange entre 10 et 12 avec une solution aqueuse de soude 4N. Le mélange est ensuite laissé sous agitation et à température ambiante toute une nuit. Après quoi, la solution est extraite avec du dichlorométhane (3× 30 ml). La phase organique est ensuite lavée plusieurs fois à l'eau puis séchée sur sulfate de sodium. L'évaporation sous pression réduite de la solution conduit à un résidu huileux. Ce dernier repris dans un minimum d'éther et à -4°C toute une nuit, cristallise pour donner 1.08 g (67%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 68-69°C.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.20 (s, 16H); 1.26 (t, 12H); 1.53 (m, 4H); 2.21 (t, 4H); 3.99 (quintuplet, 8H); 6.05 (s, 2H); 7.78 (s, 2H).

RMN ^{31}P (CDCl_3 , 81 MHz), δ (ppm): 8.76

FT-IR, ν (cm^{-1}): 793 et 1031 (P-O- CH_2CH_3); 958 (P=O); 1647 (C=N); 3187 (NHPO); 1581 et 3386 (N-H).

SM-ES+: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 527

[1,12-bis(amidinyl)dodécane]-1,12-bis-*N,N'*-phosphonate de sodium: 1.14

a) acide[1,12-bis(amidinyl)dodécane]-1,12-bis-*N,N'*-phosphonique:

A une solution de 10 ml de dichlorométhane anhydre refroidie à 0°C sous atmosphère d'azote et sous agitation de 1 g (1.9 mmol) de **1.13**, sont additionnés goutte à goutte 1.36 ml (9.51 mmol) d'iodure de triméthylsilane. Les conditions opératoires sont ainsi maintenues pendant 1 heure. La solution est ensuite évaporée sous pression réduite. Le résidu froid est repris par 10 ml d'acétone contenant 3 ml d'eau puis laissé sous agitation pendant 24 heures. Après quoi, le précipité formé est essoré, lavé plusieurs fois à l'acétone puis recristallisé dans de l'éthanol pour conduire à 0.52 g (66%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 164-165°C.

RMN ¹H (DMSO-d₆, 100 MHz), δ (ppm): 1.24 (s, 16H); 1.56 (m, 4H); 2.32 (t, 4H); 9.26 et 9.63 (2s, 8H).

RMN ³¹P (CDCl₃, 81 MHz), δ (ppm): -5.82

FT-IR, ν (cm⁻¹) : 1044 et 1211 (P-OH); 939 (P=O); 1667 (C=N); 2324 (POH);

3019 (NHPO); 1557 et 3322 (N-H).

SM-ES+: [M+H]⁺: 415

b) [1,12-bis(amidinyl)dodécane]-1,12-bis-*N,N'*-phosphonate de sodium:

1.14

A une suspension sous agitation de 1 g d'acide[1,12-bis(amidinyl)dodécane]-1,12-bis-*N,N'*-phosphonique dans 20 ml d'eau, est additionnée goutte à goutte jusqu'à pH 7.4, une solution de soude 0.1N (environ 21 ml).

Après quoi, la solution est lyophilisée pour conduire à une poudre blanche.

RMN ^{31}P (81 MHz), δ (ppm): -3.16

1, 12-bis(*N,N'*-hydroxyamidinyl)dodécane: 1.15

A une solution hydro-alcoolique de soude [préparée à partir de 8.22 g de soude, 36 ml d'eau et 138 ml d'alcool éthylique 95%], sont ajoutés 13.70 g (196.91 mmol) de chlorhydrate d'hydroxylamine. Après 15 mn d'agitation, 20 g (90.91 mmol) de 1,12-dicyanododécane sont additionnés. Le mélange réactionnel est ensuite chauffé à reflux durant 72 heures puis évaporé sous pression réduite. Le résidu obtenu est par suite repris avec de l'eau et laissé sous agitation puis filtré. Le précipité est essoré et lavé plusieurs fois à l'eau et à l'éther de pétrole. Après recristallisation avec de l'éthanol et séchage au dessiccateur toute une nuit, 25 g (96%) de produit sous forme de poudre blanche sont obtenus.

Point de fusion: 170-171 °C.

RMN ^1H (DMSO- d_6 , 100 MHz), δ (ppm): 1.70 (s, 16H); 1.90 (m, 4H); 2.39 (t, 4H); 5.75 (s, 4H); 9.13 (s, 2H).

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1661 (C=N); 3244 (N-OH); 3315 et 3400 (NH_2)

+TOF MS: 287 ($\text{M} + \text{H}$); 254 ($\text{M} - 32$); 144 ($\text{M} + \text{H} / 2$)

1, 12-bis(*N,N'*-méthoxyamidinyl)dodécane: 1.16

A une suspension refroidie par un bain de glace et sous agitation de 2 g (7 mmol) de 1.15 dans 50 ml d'un mélange diphasique dioxane / NaOH 0.7 N, sont ajoutés goutte à goutte 1.70 ml (17.48 mmol) de diméthylsulfate. L'agitation est

maintenue toute une nuit à température ambiante. Le mélange réactionnel est ensuite extrait au DCM filtré et le filtrat lavé avec 3 X 100 ml d'eau. La phase organique est séchée sur sulfate de sodium et évaporée sous pression réduite. Le résidu froid cristallise par addition d'éther de pétrole et conduit après séchage au dessiccateur, à 1.05 g (48%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 85-86 °C.

RMN ¹H (CDCl₃, 100 MHz), δ (ppm): 1.23 (s, 16H); 1.50 (m, 4H); 2.10 (t, 4H); 3.74 (s, 6H). 4.44 (s, 4H).

FT-IR, ν (cm⁻¹) : 1048 (N-O-C) ; 1643 (C=N); 3288 et 3433 (NH₂)

+TOF MS: 315 (M + H)

1, 12-bis(*N,N'*-éthoxycarbonyloxyamidinyl)dodécane: 1.17

A une suspension sous agitation de 2 g (7 mmol) de 1.15 et de 2.65 ml de triéthylamine (18.9 mmol) dans 45 ml de chloroforme, sont ajoutés goutte à goutte 1.40 ml (14.68 mmol) du chloroformiate d'éthyle dans 5 ml de chloroforme.

L'agitation est maintenue durant 3 heures à température ambiante. Le mélange réactionnel est ensuite filtré et le filtrat lavé avec 3 X 100 ml d'eau. La phase organique est séchée sur sulfate de sodium et évaporée sous pression réduite. Après cristallisation du résidu froid, les cristaux sont lavés à l'éther de pétrole et séchés au dessiccateur pour conduire à 2.53 g (84.33%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 100-101 °C.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.21 (s, 16H); 1.29 (t, 6H) 1.53 (m, 4H); 2.19 (t, 4H); 4.23 (quartet, 4H). 4.79 (s, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1240 (C-O-C); 1620 (C=N); 1741 (OCOO); 3374 et 3508 (NH_2)

+TOF MS: 431 (M + H)

5 **1, 12-bis(*N,N'*-méthoxycarbonyloxyamidinyl)dodécane: 1.18**

A une suspension sous agitation de 2 g (7 mmol) de 1.15 et de 2.65 ml de triéthylamine (18.9 mmol) dans 45 ml de chloroforme, sont ajoutés goutte à goutte 1.14 ml (14.68 mmol) de chloroformiate de méthyle dans 5 ml de chloroforme. L'agitation est maintenue durant 3 heures à température ambiante. Le mélange réactionnel est ensuite filtré et le filtrat lavé avec 3 X 100 ml d'eau. La phase organique est séchée sur sulfate de sodium et évaporée sous pression réduite. Le résidu froid est lavé avec de l'éther de pétrole puis essoré et séché au dessiccateur pour conduire à 2.05 g (73%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 79-80 °C.

15 RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.21 (s, 16H); 1.53 (m, 4H); 2.19 (t, 4H); 3.81 (s, 6H). 4.81 (s, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1247 (C-O-C); 1622 (C=N); 1750 (OCOO); 3380 et 3497 (NH_2)

+TOF MS: 403 (M + H)

1, 12-bis(*N,N'*-phénoxycarbonyloxyamidinyl)dodécane: 1.19

20 A une suspension sous agitation de 2 g (7 mmol) de 1.15 et de 2.65 ml de triéthylamine (18.9 mmol) dans 30 ml de DMF et refroidie par un bain d'eau froid, sont ajoutés goutte à goutte 1.85 ml (14.68 mmol) chloroformiate de phényle.

L'agitation est maintenue durant 4 heures à température ambiante puis le mélange réactionnel est filtré et le filtrat dilué avec 150 ml d'acétate d'éthyle. La solution est ensuite lavée avec de l'eau (100 ml) et avec une solution saturée de chlorure de sodium (2 X 100 ml). La phase organique est séchée sur sulfate de sodium et évaporée sous pression réduite. Le résidu froid est lavé avec de l'éther de pétrole puis essoré et séché au dessiccateur pour conduire à 3.02 g (82%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 108-109 C.

RMN ^1H (DMSO- d_6 , 100 MHz), δ (ppm): 1.72 (s, 16H); 1.98 (m, 4H); 2.52 (t, 4H); 6.98 (s, 4H); 7.65 - 7.98 (m, 10H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1197 et 1241 (C-O-C); 1633 (C=N); 1770(OCOO); 3309 et 3473 (NH_2)

+TOF MS: (M + H)

1, 12-bis(*N,N'*-thiométhylcarbonyloxyamidinyl)dodécane: 1.20

A une suspension sous agitation de 2.46 g (8.60 mmol) de **1.15** et de 3.26 ml de triéthylamine (23.22 mmol) dans 45 ml de chloroforme, sont ajoutés goutte à goutte 1.55 ml (18.06 mmol) de chloroformiate de thiométhyle dans 5 ml de chloroforme. L'agitation est maintenue durant 2 heures à température ambiante. Le mélange réactionnel est ensuite filtré et le filtrat lavé avec 3 X 100 ml d'eau. La phase organique est séchée sur sulfate de sodium et évaporée sous pression réduite. Le résidu froid est lavé avec de l'éther de pétrole puis essoré et séché au dessiccateur pour conduire à 3.45g (92%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 89-90 °C.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.24 (s, 16H); 1.56 (m, 4H); 2.20 (t, 4H); 2.31 (s, 6H). 4.79 (s, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1131 (C-O-C); 1605 (C=N); 1719 (OCOS); 3384 et 3496 (NH_2)

ES+ MS: 435 (M + H)

5 **1, 12-bis(*N,N'*-thioéthylcarbonyloxyamidinyl)dodécane: 1.21**

A une suspension sous agitation de 2 g (7 mmol) de 1.15 et de 2.65 ml de triéthylamine (18.9 mmol) dans 45 ml de chloroforme, sont ajoutés goutte à goutte 1.53 ml (14.68 mmol) de chloroformiate de thioéthyle dans 5 ml de chloroforme. L'agitation est maintenue durant 3 heures à température ambiante. Le mélange réactionnel est ensuite filtré et le filtrat lavé avec 3 X 100 ml d'eau. La phase organique est séchée sur sulfate de sodium et évaporée sous pression réduite. Le résidu froid est lavé avec de l'éther de pétrole puis essoré et séché au dessiccateur pour conduire à 2.70 g (83%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 59-60 °C.

15 RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.23 (s, 16H); 1.30 (t, 6H) 1.56 (m, 4H); 2.20 (t, 4H); 2.86 (quartet, 4H). 4.80 (s, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1127 (C-O-C); 1608 (C=N); 1718 (OCOS); 3386 et 3496 (NH_2)

ES+ MS: 462 (M + H)

1, 12-bis(*N,N'*-acétoxyamidinyl)dodécane: 1.22

20 A 26 ml (280 mmol) d'anhydride acétique sous agitation et refroidie par un bain d'eau glacée, sont ajoutés portion par portion 2 g (7 mmol) de 1.15. L'agitation est maintenue durant 2 heures à température ambiante. Au mélange réactionnel, sont ajoutés 100 ml de chloroforme. La solution est ensuite lavée successivement avec 2

X 100 ml d'une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium, 3 X 100 ml d'une solution de soude 3N et 100 ml d'eau. La phase organique est séchée sur sulfate de sodium et évaporée sous pression réduite. Après cristallisation du résidu froid, les cristaux sont lavés à l'éther de pétrole et séchés au dessiccateur pour conduire à
 5 2.33 g (90%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 128-129 °C.

RMN ¹H (CDCl₃, 100 MHz), δ (ppm): 1.23 (s, 16H); 1.55 (m, 4H); 2.12 (s, 6H); 2.23 (t, 4H); 5.74 (s, 4H).

FT-IR, ν (cm⁻¹) : 1232 (C-O-C); 1633 (C=N); 1736 (OCO); 3319 et 3425 (NH₂)

10 +TOF MS: 371 (M + H)

1, 12-bis(*N,N'*-benzoyloxyamidinyl)dodécane: 1.23

A une suspension sous agitation de 1.5 g (5.24 mmol) de 1.15 et de 2 ml de triéthylamine (14.16 mmol) dans 30 ml de DMF et refroidie par un bain d'eau froid, sont ajoutés goutte à goutte 1.28 ml (14.68 mmol) chlorure de benzoyle. L'agitation
 15 est maintenue durant 3 heures à température ambiante puis le mélange réactionnel est filtré et le filtrat précipité dans 200 ml d'eau froide. Le précipité est ensuite essoré, lavé à l'eau et à l'éther de pétrole puis séché au dessiccateur pour conduire à 2.25 g (87%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 158-159 C.

20 RMN ¹H (DMSO-d₆, 100 MHz), δ (ppm): 1.73 (s, 16H); 2.01 (m, 4H); 2.56 (t, 4H); 6.94 (s, 4H); 7.96 - 8.11 (m, 6H); 8.54 - 8.61 (m, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 684 et 699 (C-H aromatiques); 1266 (C-O-C); 1625 (C=N); 1721 (OCO); 3315 et 3452 (NH_2)

1, 12-bis(*N,N'*-éthylcarbamoyloxyamidinyl)dodécane: 1.24

A une suspension sous agitation de 2 g (7 mmol) de **1.15** et de 1.01 g de carbonate de potassium (7.34 mmol) dans 80 ml de chloroforme, sont ajoutés goutte à goutte 1.16 ml (14.68 mmol) d'éthyle isocyanate. L'agitation est maintenue toute une nuit à température ambiante. Le mélange réactionnel est ensuite filtré et le filtrat lavé avec 2 X 100 ml d'eau. La phase organique est par suite séchée sur sulfate de sodium et évaporée sous pression réduite pour conduire à 2.22 g (74%) de produit sous forme d'huile colorée.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.14 (t, 6H); 1.22 (s, 16H); 1.51 (m, 4H); 2.12 (t, 4H); 3.26 (quintuplet, 4H). 5.00 (s, 4H); 6.44 (t, 2H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1650 (C=N); 1701 (OCONH); 3335 (NH); 3374 et 3490 (NH_2)

+TOF MS: 429 ($\text{M} + \text{H}$)

1,12-bis(*N,N'*-phénylcarbamoyloxyamidinyl)dodécane: 1.25

A une suspension sous agitation refroidie à 0°C par un bain d'eau froid, de 2 g (7 mmol) de **1.15** et de 1.01 g de carbonate de potassium (7.34 mmol) dans 40 ml de DMF, sont ajoutés goutte à goutte 1.6 ml (14.68 mmol) de phényle isocyanate. L'agitation est maintenue durant 2H30 à température ambiante. Le mélange réactionnel est ensuite filtré et le filtrat précipité dans 150 ml d'eau froide. Le précipité est par suite lavé successivement avec de l'eau, de l'acétone et de l'éther.

Après séchage au dessiccateur, 2.95 g (80%) de produit sont obtenus sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 134-135 °C.

RMN ^1H (DMSO- d_6 , 100 MHz), δ (ppm): 1.72 (s, 16H); 2.0 (m, 4H); 2.55
5 (t, 4H); 6.83 (s, 4H); 7.54 (t, 2H); 7.76 (t, 4H); 7.93 (t, 4H); 9.65 (s, 2H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1018 et 1220 (C-O-C); 1628 (C=N); 1708 (CON); 3249
(OCONH); 3345 et 3455 (NH_2)

ES+ MS: 525 (M + H); 263 (M + H/2)

[1,12-bis(amidinyl)dodécane]-1,12-bis-*N,N'*-phosphate de diéthyle: 1.26

10 A une suspension sous agitation refroidie à 0°C par un bain d'eau froid, de 2 g
(7 mmol) de 1.15 et de 2.06 ml de triéthylamine (14.68 mmol) dans 30 ml de DMF,
sont ajoutés goutte à goutte 2.08 ml (14.33 mmol) de diéthylchlorophosphate.
L'agitation est maintenue durant 16h à température ambiante. Le mélange
réactionnel est ensuite filtré et le filtrat repris avec 150 ml d'acétate d'éthyle. La
15 phase organique est par suite lavée avec 3 X 200 ml d'eau puis séchée sur sulfate de
sodium et évaporée sous pression réduite pour conduire à 2.88 g (74%) de produit
sous forme d'huile colorée.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.21 (s, 16H); 1.31 (t, 12H); 1.51 (m, 4H);
2.15 (t, 4H); 4.15 (quintuplet, 8H); 4.30 (s, 4H).

20 FT-IR, ν (cm^{-1}) : 837 et 1027 (OP-O- CH_2CH_3); 969 (OP=O); 1648 (C=N); 3323
et 3487 (NH_2).

ES+ MS: 559 (M + H)

1,12-bis[(1,2,4-oxadiazol-5(4*H*)-one)-3-yl]dodécane: 1.27

Une suspension sous agitation de 4 g (9.30 mmol) de 1.17 dans 70 ml de xylène, est chauffée à 150°C durant 2 heures (jusqu'à la formation d'une couche huileuse colorée). Le mélange réactionnel est ensuite évaporé sous pression réduite.

5 Le résidu solide obtenu est par suite dissout dans 50 ml de DMSO puis précipité dans 200 ml d'eau froide. Le précipité formé est essoré puis redissout dans de l'acétone et filtré. Le filtrat séché sur sulfate de sodium et évaporé sous pression réduite conduit après séchage au dessiccateur, à 2.97 g (94%) de produit sous forme de cristaux colorés.

10 Point de fusion: 150-151 °C.

RMN ¹H (DMSO-d₆, 100 MHz), δ (ppm): 1.71 (s, 16H); 2.03 (m, 4H); 2.93 (t, 4H).

FT-IR, n (cm⁻¹) : 1718 (C=N); 1783 (OCONH); 3163 (NHCO).

ES+ MS: 339 (M + H)

15

1,12-bis[(1,2,3,5-oxathiadiazol-2(3*H*)-oxyde)-4-yl]dodécane: 1.28

A une suspension sous agitation et refroidie à 0°C de 2 g (7 mmol) de 1.15 et de 2.82 ml de pyridine (34.96 mmol) dans 30 ml de DMF, sont ajoutés goutte à goutte 1.1 ml (15.03 mmol) de chlorure de thionyle. L'agitation est maintenue
20 durant 45 minutes à froid puis la solution réactionnelle est précipitée dans 150 ml d'eau froide. Le précipité filtré et séché au dessiccateur, conduit à 1.65 g (62%) de produit sous forme de poudre colorée.

Point de fusion: 94-95 °C.

RMN ^1H (DMSO- d_6 , 100 MHz), δ (ppm): 1.71 (s, 16H); 2.05 (m, 4H); 2.99 (t, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1146 (NSOC); 1615 (C-N); 1655 (C=N); 3219 et 3323 (NHSO).

5 ES+ MS: 379 (M + H)

1,12-bis[(1,2,4-oxadiazol-5(4H)-thione)-3-yl]dodécane: 1.29

A une suspension sous agitation et refroidie à 0°C de 2 g (5.4 mmol) de 1.22 et de 2.5 ml (34.96 mmol) de sulfure de carbone dans 50 ml de DMF, sont ajoutés lentement 1.32 g (32.97 mmol) d'hydruure de sodium 60%. L'agitation est maintenue
10 durant 45 minutes à froid puis durant 2 heures à température ambiante. La solution réactionnelle est ensuite précipitée dans 150 ml d'eau froide, acidifiée à pH 5 avec HCl 2N puis extraite avec 3 X 50 ml d'acétate d'éthyle. La phase organique lavée à l'eau puis séchée sur sulfate de sodium et évaporée sous pression réduite conduit à
15 séchage au dessiccateur à 1.45 g (72%) de produit sous forme de poudre colorés.

RMN ^1H (DMSO- d_6 , 100 MHz), δ (ppm): 1.71 (s, 16H); 2.06 (m, 4H); 3.02 (t, 4H); 9.25 (s, 2H)

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1644 (C=N); 1737 (SCONH); 3090 (NHCO).

ES+ MS: 371 (M + H); 313 [M + 2H - 60 (SCO)]

20

1,12-bis[(1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one)-3-yl]dodécane: 1.30

Une suspension de 2 g (7 mmol) de 1.15 et de 3.74 g (21 mmol) de 1,1'-thiocarbonyl diimidazole dans 70 ml de THF est laissée sous agitation et à température ambiante durant 16 heures. Le mélange réactionnel est dilué avec 150 ml d'eau et extrait avec 3 X 70 ml d'acétate d'éthyle. La phase organique est ensuite lavée avec de l'eau, séchée sur sulfate de sodium et évaporée sous pression réduite. Le résidu huileux est repris avec 50 ml de THF auquel sont ajoutés 5.32 ml (41.96 mmol) de $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$. Le mélange réactionnel obtenu est par suite laissé sous agitation toute une nuit à température ambiante. La solution est diluée avec de l'eau, extraite avec de l'acétate d'éthyle, lavée à l'eau, séchée puis évaporée sous pression réduite. Le résidu froid obtenu est ensuite repris avec 50 ml d'éthanol et précipité dans 200 ml d'eau froide. Le précipité isolé, est finalement lavé à l'eau et séché pour donner 1.62 g (62.55%) de produit sous forme de poudre orange.

RMN ^1H ($\text{DMSO}-d_6$, 100 MHz), δ (ppm): 1.70 (s, 16H); 2.04 (m, 4H); 2.93 (t, 4H); 9.30 (s, 2H)

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1666 (C=N); 1707 (SCONH); 3129 (NHCO).

+TOF MS: 313 [$\text{M} + 2\text{H} - 60$ (SCO)]

1,14-di(pyrrolidin-1-yl)tétradécane-1,14-diimine: 2.0, 2HCl

Un mélange constitué de 1.16 g (3 mmol) de dichlorhydrate de diéthyl tétradécane diimidoate, 0.51 ml de pyrrolidine et 15 ml d'éthanol est chauffé au reflux pendant 24 heures. Après évaporation, le résidu obtenu est recristallisé dans un mélange méthanol-éther pour conduire à 0.97 g (75%) de poudre beige.

Point de fusion: 171°C

RMN ^1H (CD_3OD , 250 MHz), δ (ppm): 1,35 (m, 16H); 1,68 (m, 4H); 2,08 (m, 8H); 2,55 (t, 4H); 3,42 (t, 4H); 3,70 (t, 4H); 9,12 (s, 4H)

1,14-di(pipéridin-1-yl)tétradécane-1,14-diimine: 3.0

On ajoute à 2,2 g (10 mmol) de 1,12-dicyanododécane et 1,98 g (20 mmol) de
 5 CuCl , 1,68 ml (20 mmol) de pipéridine anhydre. Le mélange, initialement vert, bleuit. On chauffe ensuite à 80°C pendant 20 heures, et la solution rouge résultante est versée dans 125 ml d'éther et agitée 2 mn avec 12 ml de NaOH (30% aqueux). La phase organique est isolée et séchée sur SO_4Na_2 , filtrée et évaporée. Le résidu obtenu est recristallisé dans l'éther (Rendement 50%).

10 Point de fusion: $149\text{--}150^\circ\text{C}$

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1,3 (m, 20H); 1,4-1,6 (m, 12H); 2,2 (t, 4H); 3,3 (m, 8H); 6,5 (m, 2H).

$\text{N}^1, \text{N}^1, \text{N}^{14}, \text{N}^{14}$ -tétraméthyltétradécanediimidamide: 4.0, 2HCl

1,16 g (3 mmol) de dichlorhydrate de diéthyl tétradécanediimidoate et 1,1 ml
 15 d'une solution de diméthylamine dans l'éthanol (5,6M) sont mélangés à 15 ml d'éthanol et chauffés au reflux pendant 26 heures. Après quoi, le solvant est évaporé et le résidu obtenu est recristallisé dans un mélange méthanol-éther pour conduire à 0,98 g (85%) de poudre verdâtre.

Point de fusion: 209°C

20 RMN ^1H (CD_3OD , 250 MHz), δ (ppm): 1,35 (m, 16H); 1,68 (m, 4H); 2,59 (t, 4H); 3,12 (s, 6H); 3,25 (s, 6H); 9,10 (s, 4H)

$\text{N}^1, \text{N}^1, \text{N}^{14}, \text{N}^{14}$ -tétraméthyloctadécanediimidamide: 5.0

Un mélange de 0,46 g (1,2 mmol) de dichlorhydrate de diéthyl octadécane-diimidoate dans 5,3 ml d'une solution d'ammoniac dans le méthanol (2M) est refroidie à -10°C pendant 1 heure, puis laissée à température ambiante 15 heures. Après évaporation du solvant, le résidu obtenu est recristallisé à l'aide d'un mélange méthanol-éther, filtré et séché au dessiccateur, pour conduire à 0,25 g (54%) de produit.

Point de fusion: 196-198°C

RMN ¹H (DMSO-d₆, 250 MHz), δ (ppm): 1,24 (m, 24H); 1,60 (m, 4H); 2,37 (t, 4H); 8,82 (s, 4H); 9,10 (s, 4H)

1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane: 6.0

a) Dichlorhydrate de 1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane: 6.0, 2HCl

A une solution de 4.5 g (11.69 mmol) de chlorhydrate de 1,14-diéthoxytétradécane-1,14-diimine dans 100 ml d'éthanol absolu, sont ajoutés lentement et à froid 1.64 ml (24.55 mmol) d'éthylène diamine. Le mélange réactionnel est ensuite chauffé à reflux pendant 4 heures. Après évaporation sous pression réduite au minimum de solvant, le résidu froid obtenu est cristallisé par addition d'éther sous agitation. Le précipité isolé par filtration, est ensuite lavé à l'éther et séché au dessiccateur, pour conduire à 3.9 g (88%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 191-192°C

RMN ¹H (DMSO-d₆, 100 MHz), δ (ppm): 1.22 (s, 16H); 1.57 (m, 4H); 2.45 (t, 4H); 3.75 (s, 8H); 9.28 (s, 4H).

FT-IR, ν (cm⁻¹): 1600 (C=N); 3031 (C=NH, HCl); 3200 (N-H)

b) 1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane: 6.0

A une solution aqueuse (20 ml) de 2 g (5.28 mmol) de 6.0, 2 HCl , est additionnée goutte à goutte et sous agitation, de la triéthylamine jusqu'à pH 14. Le précipité formé est essoré, lavé à l'eau, à l'acétone puis à l'éther et séché au dessiccateur pour conduire à 1.4 g (86.4%) de base libre sous forme de poudre blanche. Cette poudre est ensuite recristallisée dans du méthanol et donne 1.26 g (90%) de produit sous forme de cristaux blancs.

Point de fusion: 176-178°C

10 RMN ¹H (CD₃OD, 100 MHz), δ (ppm): 1.29 (s, 16H); 1.55 (m, 4H); 2.20 (t, 4H); 3.52 (s, 8H).

FT-IR, ν (cm⁻¹): 1611 (C=N); 3177 (N-H)

1,12-bis[N,N'-(méthyloxycarbonyl) imidazolin-2-yl]dodécane: 6.1

A une suspension de 1.5 g (4.90 mmol) de 1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane et de 1.5 ml (10.78 mmol) de triéthylamine dans 25 ml de chloroforme refroidie par un bain de glace, sont additionnés goutte à goutte et sous agitation 0.80 ml (10.29 mmol) de chloroformiate de méthyle en solution dans 5 ml de chloroforme. Après quoi, l'agitation est maintenue à température ambiante toute une nuit Le mélange réactionnel est ensuite filtré et le filtrat lavé successivement avec 120 ml d'eau, 120 ml d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium et 2 x 120 ml d'eau. Après séchage sur sulfate de sodium, la phase organique est évaporée sous pression réduite pour conduire à un résidu huileux. Ce dernier repris dans de l'éther de pétrole et laissé à -4°C donne 1.51 g (73%) de produit sous forme d'un liquide blanc.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.20 (s, 16H); 1.58 (m, 4H); 2.64 (t, 4H); 3.70 (s, 8H); 3.76 (s, 6H).

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1142 et 1194 (C-O-C); 1642 (C=N); 1723 (NCO).

1,12-bis[*N,N'*-(éthyloxycarbonyl)imidazolin-2-yl]dodécane: 6.2

5 A une suspension de 1.5 g (4.90 mmol) de 1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane et de 1.5 ml (10.78 mmol) de triéthylamine dans 25 ml de chloroforme refroidie par un bain de glace, sont additionnés goutte à goutte et sous agitation 0.98 ml (10.29 mmol) de chloroformiate d'éthyle en solution dans 5 ml de chloroforme. Après quoi, l'agitation est maintenue à température ambiante toute une nuit. Le mélange
10 réactionnel est ensuite filtré et le filtrat lavé successivement avec 120 ml d'eau, 120 ml d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium et 2 x 120 ml d'eau. Après séchage sur sulfate de sodium, la phase organique est évaporée sous pression réduite pour conduire à 1.78 g (81%) de produit sous forme d'huile.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.22 (s, 16H); 1.30 (t, 6H); 1.59 (m, 4H);
15 2.65 (t, 4H); 3.72 (s, 8H); 4.16 (q, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1073 et 1099 (C-O-C); 1644 (C=N); 1720 (NCO).

1,12-bis[*N,N'*-(butyloxycarbonyl)imidazolin-2-yl]dodécane: 6.3

A une suspension de 1.5 g (4.90 mmol) de 1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane et de 1.5 ml (10.78 mmol) de triéthylamine dans 25 ml de chloroforme refroidie par un bain de glace, sont additionnés goutte à goutte et sous agitation 1.33 ml (10.29
20 mmol) de chloroformiate de butyle en solution dans 5 ml de chloroforme. Après quoi, l'agitation est maintenue à température ambiante toute une nuit. Le mélange

réactionnel est ensuite filtré et le filtrat lavé successivement avec 120 ml d'eau, 120 ml d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium et 2 x 120 ml d'eau. Après séchage sur sulfate de sodium, la phase organique est évaporée sous pression réduite pour conduire à 2.05 g (82%) de produit sous forme d'huile.

5 RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 0.88 (t, 6H); 1.20 (s, 16H); 1.36 -1.64 (m, 12H); 2.63 (t, 4H); 3.71 (s, 8H); 4.08 (t, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1073 et 1152 (C-O-C); 1644 (C=N); 1722 (NCO).

1,12-bis[*N,N'*-(isobutyloxycarbonyl)imidazolin-2-yl]dodécane: 6.4

A une suspension de 1.5 g (4.90 mmol) de 1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane
10 et de 1.5 ml (10.78 mmol) de triéthylamine dans 25 ml de chloroforme refroidie par un bain de glace, sont additionnés goutte à goutte et sous agitation 1.35 ml (10.29 mmol) de chloroformiate d'isobutyle en solution dans 5 ml de chloroforme. Après quoi, l'agitation est maintenue à température ambiante toute une nuit. Le mélange réactionnel est ensuite filtré et le filtrat lavé successivement avec 120 ml d'eau, 120
15 ml d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium et 2 x 120 ml d'eau. Après séchage sur sulfate de sodium, la phase organique est évaporée sous pression réduite pour conduire à un résidu huileux. Ce dernier repris dans de l'éther de pétrole et laissé à -4°C donne 2.26 g (91%) de produit sous forme d'un solide blanc.

Point de fusion: $< 40^\circ\text{C}$

20 RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 0.87 (d, 12H); 1.17 (s, 16H); 1.55 (m, 4H); 1.89 (quint., 2H); 2.62 (t, 4H); 3.70 (s, 8H); 3.84 (d, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1072 et 1142 (C-O-C); 1642 (C=N); 1722 (NCO).

1,12-bis[*N,N'*-(benzyloxycarbonyl)imidazolin-2-yl]dodécane: 6.5

A une suspension de 1 g (3.27 mmol) de 1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane et de 0.85 ml (6.54 mmol) de triéthylamine dans 30 ml de chloroforme refroidie par un bain de glace, sont additionnés goutte à goutte et sous agitation 0.94ml (6.54 mmol) de chloroformiate de benzyle dans 5 ml de chloroforme. Après quoi, l'agitation est maintenue à température ambiante toute une nuit. La solution obtenue est évaporée sous pression réduite. Le précipité isolé est par suite extrait plusieurs fois avec de l'éther. L'évaporation sous pression réduite de la phase étherée, conduit à 1.02 g (54%) de produit sous forme d'huile se cristallisant en poudre blanche à - 4°C dans de l'éther.

Point de fusion: 75-76°C

RMN ¹H (CDCl₃, 100 MHz), δ (ppm): 1.23 (s, 16H); 1.60 (m, 4H); 2.68 (t, 4H); 3.77 (s, 8H); 5.16 (s, 4H); 7.35 (s, 10H).

FT-IR, ν (cm⁻¹) : 1142 et 1299 (C-O-C); 1646 (C=N); 1714 (NCO)

SM-ES+: [M+H]⁺: 575

1,12-bis[*N,N'*-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)imidazolin-2-yl]dodécane: 6.6

A une suspension de 1 g (3.27 mmol) de 1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane et de 0.87 ml (6.70 mmol) de triéthylamine dans 20 ml de chloroforme refroidie par un bain de glace, sont additionnés goutte à goutte et sous agitation 1.44 g (6.70 mmol) de chloroformiate de 4-nitrobenzyle en solution dans 10 ml de chloroforme. Après quoi, l'agitation est maintenue à température ambiante toute une nuit. Le mélange

réactionnel est ensuite dilué avec 30 ml de chloroforme puis lavé successivement avec 120 ml d'eau, 120 ml d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium et 2 x 120 ml d'eau. Après séchage sur sulfate de sodium, la phase organique est évaporée sous pression réduite. Le résidu refroidi et repris dans un minimum de chloroforme, est enfin cristallisé à -4°C avec de l'hexane pour conduire à 2.08g
5 (96%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 115-116°C

RMN ¹H (CDCl₃, 100 MHz), δ (ppm): 1.21 (s, 16H); 1.60 (m, 4H); 2.67 (t, 4H); 3.80 (s, 8H); 5.24 (s, 4H); 7.46 et 7.55 (dd, 4H); 8.17 et 8.25 (dd, 4H).

10 FT-IR, ν (cm⁻¹): 1005 et 1154 (C-O-C); 1343 et 1517 (NO₂); 1645 (C=N); 1724 (NCO).

SM-ES+: [M+H]⁺: 665

1,12-bis[*N,N'*-(phényloxycarbonyl)imidazolin-2-yl]dodécane: 6.7

A une suspension de 1.5 g (4.90 mmol) de 1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane
15 et de 1.3 ml (10.05 mmol) de triéthylamine dans 25 ml de chloroforme refroidie par un bain de glace, sont additionnés goutte à goutte et sous agitation 1.26 (10.05 mmol) de chloroformiate de phényle en solution dans 5 ml de chloroforme. Après quoi, l'agitation est maintenue à température ambiante toute une nuit. Le mélange réactionnel est ensuite dilué avec 30 ml de chloroforme puis lavé successivement
20 avec 120 ml d'eau, 120 ml d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium et 2 x 120 ml d'eau. Après séchage sur sulfate de sodium, la phase organique est

éaporée sous pression réduite pour conduire à 2.42 g (90%) de produit sous forme d'huile.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.21 (s, 16H); 1.64 (m, 4H); 2.72 (t, 4H); 3.89 (s, 8H); 7.06 - 7.43 (m, 10H)

5 FT-IR, ν (cm^{-1}): 1162 et 1188 (C-O-C); 1646 (C=N); 1737 (NCO).

SM-ES+: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 547; $[\text{M}+2\text{H}]^{2+} / 2$: 274 (100%)

1,12-bis[*N,N'*-(4-fluorophényloxyloxy)carbonyl]imidazolin-2-yl]dodécane:

6.8

A une suspension de 1 g (3.27 mmol) de 1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane et
10 de 0.89 ml (6.86 mmol) de triéthylamine dans 20 ml de chloroforme refroidie par un
bain de glace, sont additionnés goutte à goutte et sous agitation 0.89 ml (6.70 mmol)
de chloroformiate de 4-fluorophényle en solution dans 5 ml de chloroforme. Après
quoi, l'agitation est maintenue à température ambiante toute une nuit. Le mélange
réactionnel est ensuite dilué avec 20 ml de chloroforme puis lavé successivement
15 avec 60 ml d'eau, 60ml d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium et 2 x
60 ml d'eau. Après séchage sur sulfate de sodium, la phase organique est évaporée
sous pression réduite. Le résidu refroidi est enfin cristallisé à -4°C avec de l'hexane
pour conduire à 1.70 g (85%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: $95-96^\circ\text{C}$

20 RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.21 (s, 16H); 1.64 (m, 4H); 2.71 (t, 4H); 3.90 (s, 8H); 7.03 et 7.36 (d, 8H).

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1100 (C-F); 1179 (C-O-C); 1655 (C=N); 1733 (NCO).



5

10

1,12-bis[N,N'-(4-méthoxyphényloxy)carbonyl]imidazolin-2-yl] dodécane: 6.9

15

1.31 g (66%) de produit sous forme d'huile.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.21 (s, 16H); 1.63 (s, 4H); 2.71 (t, 4H); 3.75 (s, 8H); 3.88 (s 2H); 6.61 à 7.10 (m, 8H).

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1177 et 1248 (C-O-C); 1646 (C=N); 1735 (NCO).

SM-ES+: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 607; $[\text{M}+2\text{H}]^{2+}/2$: 304 (100%)

5 **1,12-bis[*N,N'*-(4-nitrophényloxy-carbonyl)imidazolin-2-yl]dodécane: 6.10**

A une suspension de 1 g (3.27 mmol) de 1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane et de 0.89 ml (6.86 mmol) de triéthylamine dans 25 ml de chloroforme refroidie par un bain de glace, sont additionnés goutte à goutte et sous agitation 1.38 g (6.86 mmol) de chloroformiate de 4-nitrophényle en solution dans 5 ml de chloroforme. Après
10 quoi, l'agitation est maintenue à température ambiante pendant 5 heures. Après évaporation sous pression réduite de la solution, le précipité formé est ensuite lavé à l'eau puis à l'acétone. Le solide jaune obtenu est par suite cristallisé par dissolution dans un minimum de dichlorométhane et par addition lente d'acétone. Le produit est isolé sous forme de cristaux blancs à 74% (1.54 g).

15 Point de fusion: 121-122°C

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.23 (s, 16H); 1.67 (m, 4H); 2.73 (t, 4H); 3.95 (s, 8H); 7.25 et 7.36 (dd, 4H); 8.24 et 8.32 (dd, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1185 et 1196 (C-O-C); 1349 et 1524 (NO_2); 1656 (C=N); 1748 (NCO).

20 SM-ES+: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 637; $[\text{M}+2\text{H}]^{2+}/2$: 319 (100%)

1,12-bis[*N,N'*-(acétoxyméthoxycarbonyl)imidazolin-2-yl]dodécane: 6.11

A une suspension de 1 g (3.27 mmol) de 1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane et de 0.92 ml (6.54 mmol) de triéthylamine dans 20 ml de chloroforme refroidie par un bain de glace, sont additionnés goutte à goutte et sous agitation 1 g (6.54 mmol) de chloroformiate d'acétoxyméthyle en solution dans 5 ml de chloroforme. Après
 5 quoi, l'agitation est maintenue à température ambiante toute une nuit. Le mélange réactionnel est ensuite lavé successivement avec 20 ml d'eau, 20ml d'une solution aqueuse de bicarbonate de sodium à 5% puis 20 ml d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium. Après séchage sur sulfate de sodium, la phase organique est évaporée sous pression réduite pour conduire à 2.95 g (84%) de produit sous forme
 10 d'une huile.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.21 (s, 16H); 1.58 (m, 4H); 2.08 (s, 6H); 2.65 (t, 4H); 3.74 (s, 8H); 5.74 (s, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1643 (C=N); 1682 (NCO); 1736 (OCO).

SM-ES+: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 539

15 **1,12-bis[*N,N'*-((1-acétoxyéthoxy)carbonyl)imidazolin-2-yl]dodécane: 6.12**

a) Dichlorhydrate de 1,12-bis[*N,N'*-((1-chloroéthoxy)carbonyl)imidazolin-2-yl]dodécane

A une suspension de 2.50 g (8.17 mmol) de 1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane et de 2.16 ml (16.75 mmol) de triéthylamine dans 40 ml de chloroforme refroidie par un bain de glace, sont additionnés goutte à goutte et sous
 20 agitation 1.8 ml (16.75 mmol) de chloroformiate de 1-chloroéthyle en solution dans 10 ml de chloroforme. Après quoi, l'agitation est maintenue à température ambiante

toute une nuit. Le mélange réactionnel est ensuite filtré et le filtrat lavé successivement avec 100 ml d'eau, 100 ml d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium et 3 x 100 ml d'eau. Après séchage sur sulfate de sodium, la phase organique est évaporée sous pression réduite. Le résidu refroidi est ensuite cristallisé à -4°C avec de l'hexane pour conduire à 3.91g (92%) de produit sous forme de poudre blanche.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.19 (s, 16H); 1.58 (m, 4H); 1.77 (d, 6H); 2.64 (t, 4H); 3.74 (s, 8H); 6.49 (q, 2H).

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1087 (C-O-C); 1377 (CH_3 ; C-H); 1648 (C=N); 1737 (NCO).

b) **1,12-bis[*N,N'*-((1-acétoxyéthoxy)carbonyl)imidazolin-2-yl]dodécane :**
6.12

Une solution d'acide acétique contenant 3.20 g (6.17 mmol) de dichlorhydrate de 1,12-bis[*N,N'*-((1-chloroéthoxy)carbonyl)imidazolin-2-yl]dodécane et 5.9 g (18.50 mmol) d'acétate mercurique est laissée sous agitation et à température ambiante durant 72 heures. Après évaporation du solvant sous pression réduite, le résidu réactionnel est dilué dans 150 ml de chloroforme puis filtré. Le filtrat est ensuite lavé avec 3 x 300 ml d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium. Le séchage sur sulfate de sodium et l'évaporée sous pression réduite de la phase organique conduit à 2.40 g (68%) de produit sous forme d'huile colorée.

RMN ^1H ($\text{DMSO}-d_6$, 100 MHz), δ (ppm): 1.24 (s, 16H); 1.44 (d, 6H); 1.52 (m, 4H); 2.03 (s, 6H); 2.61 (t, 4H); 3.79 (s, 8H); 6.69 (q, 2H).

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1072 et 1224 (C-O-C); 1645 (C=N); 1684 (NCO); 1733 (CO)

SM-ES+: $[M+H]^+$: 567

[1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane]-1,12-bis-*N,N'*-phosphonate de diphenyle:

6.13

A une suspension de 1 g (3.26 mmol) de 1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane et
5 de 0.96 ml (6.86 mmol) de triéthylamine dans 25 ml de chloroforme refroidie par un
bain de glace, sont additionnés goutte à goutte et sous agitation 1.40 (6.70 mmol) de
diphénylchlorophosphonate en solution dans 5 ml de chloroforme. Après quoi,
l'agitation est maintenue à température ambiante toute une nuit. Le mélange
réactionnel est ensuite filtré et le filtrat lavé successivement avec 100 ml d'eau, 100
10 ml d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium et 2 x 100 ml d'eau. Après
séchage sur sulfate de sodium, la phase organique est évaporée sous pression réduite
pour conduire à 2.37 g (94%) de produit sous forme d'huile.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.20 (s, 16H); 1.62 (m, 4H); 2.58 (t, 4H);
3.79 (s, 8H); 7.17 - 7.34 (m, 20H).

15 FT-IR, ν (cm^{-1}): 925 (P=O); 1160 et 1184 (C-O); 1646 (C=N).

[1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane]-1,12-bis-*N,N'*-phosphonate de diéthyle: 6.14

A une suspension de 1.5 g (4.90 mmol) de 1,12-bis(imidazolin-2-yl)dodécane
et de 1.5 ml (10.78 mmol) de triéthylamine dans 25 ml de chloroforme refroidie par
un bain de glace, sont additionnés goutte à goutte et sous agitation 1.49 ml (10.29
20 mmol) de diéthylchlorophosphonate en solution dans 5 ml de chloroforme. Après
quoi, l'agitation est maintenue à température ambiante toute une nuit. Le mélange
réactionnel est ensuite filtré et le filtrat lavé successivement avec 100 ml d'eau, 100
ml d'une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium et 2 x 100 ml d'eau. Après

séchage sur sulfate de sodium, la phase organique est évaporée sous pression réduite pour conduire à 2.38 g (84%) de produit sous forme d'huile.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.15 (s, 16H); 1.23 (t, 12H); 1.54 (m, 4H); 2.37 (t, 4H); 3.60 (t, 8H); 4.00 (quintuplet, 8H).

5 FT-IR, ν (cm^{-1}): 963 (P=O); 1016 et 1268 (C-O); 1640 (C=N).

SM-ES+: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 579; $[\text{M}+\text{H}]^{2+}/2$: 290 (100%)

Dichlorhydrate de 1, 12-bis(1-méthyl imidazolin-2-yl)dodécane: 7.0, 2HCl

3.9 g (10 mmol) de dichlorhydrate de diéthyltétradécanediimidoate sont mis à reflux avec un excès de N-méthyl éthylènediamine pendant 24 heures. Après
10 refroidissement de la solution, on ajoute de l'éther éthylique dans la solution. Les cristaux obtenus sont isolés par filtration, lavés à l'éther et séchés au dessiccateur, pour conduire à 2.9 g (71%) de cristaux blancs.

Point de fusion: 166-170°C

RMN ^1H ($\text{DMSO}-d_6$, 100 MHz), δ (ppm): 1.38 (m, 16H); 1.67 (m, 4H); 2.47
15 (t, 4H); 2.90 (s, 6H); 3.35 (s, 8H); 9.28 (m, 2H).

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1600 (C=N); 3031 (C=NH, HCl); 3200 (N-H)

Dichlorhydrate de 1,12-bis(1,4,5,6-tétrahydropyrimidin-2-yl)dodécane: 8.0, 2HCl

A une solution de 1,16 g (3mmol) de dichlorhydrate de
20 diéthyltétradécanediimidoate dans 15 ml d'éthanol absolu, sont ajoutés 0,51 ml (6,12 mmol) de 1,3-diaminopropane. Le mélange réactionnel est ensuite chauffé à reflux pendant 6 heures. Après addition de 4,5 ml d'eau, la température du mélange réactionnel est portée à 95°C pendant 4 heures. Après évaporation à sec, le résidu

obtenu est cristallisé par addition d'éther puis agitation pendant 48 heures. Le précipité isolé par filtration, est ensuite lavé plusieurs fois par agitation forte dans l'éther et séché au dessiccateur, pour conduire à 0,83 g (68%) de cristaux blancs.

Point de fusion: 117-119°C

5 RMN ^1H (DMSO- d_6 , 250 MHz), δ (ppm): 1,22 (s, 16H); 1,55 (m, 4H); 1,80 (m, 4H); 2,45 (t, 4H); 3,25 (s, 8H); 9,28 (m, 2H).

Dichlorhydrate de 1,12-bis(4-méthyl imidazolin-2-yl)dodécane: 9.0, 2HCl

A une solution de 0,96 g (2,5 mmol) de dichlorhydrate de diéthyl
10 tétradécanediimidoate dans 12 ml d'éthanol anhydre, sont ajoutés sous agitation, 0,44 ml (5,1 mmol) de 1,2-diaminopropane. Le mélange est ensuite chauffé à une température de 90°C durant 48 heures. Après évaporation du solvant, le résidu obtenu est solubilisé dans de l'éthanol puis filtré. Le filtrat est évaporé puis de l'éther est additionné et éliminé sous pression réduite afin d'entraîner les restes de
15 solvant. 0,71 g (70%) de produit sont alors obtenu sous forme de poudre blanche.

RMN ^1H (DMSO- d_6 , 250 MHz), δ (ppm): 1,30 (m, 22H); 1,64 (m, 4H); 2,52 (t, 4H); 3,40 (t, 2H); 3,95 (t, 2H); 3,95 (m, 2H); 9,32 (m, 2H).

Dichlorhydrate de 1,12-bis(4,4-diméthyl imidazolin-2-yl)dodécane: 10.0, 2HCl

Le mélange réactionnel composé de 0,96 g (2,5 mmol) de dichlorhydrate de
20 diéthyl tétradécanediimidoate dans 12 ml d'éthanol anhydre et de 0,54 ml (5,1 mmol) de 1,2-diamino-2-méthylpropane est chauffé à 90°C pendant 48 heures. Le solvant est évaporé, et le résidu est solubilisé dans de l'éthanol à chaud. Après refroidissement à température ambiante, le solide formé est filtré puis traité à l'éther

comme le composé **9.0, 2HCl** pour conduire à 0,76 g (70%) de produit sous forme de poudre beige.

RMN ^1H (DMSO- d_6 , 250 MHz), δ (ppm): 1,24 (s, 12H); 1,32 (s, 16H); 1,62 (m, 4H); 2,50 (t, 4H); 3,54 (s, 4H); 9,30 (m, 2H).

5

Dichlorhydrate de 1,12-di(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-benzimidazo-2-yl)dodécane: 11.0, 2HCl

0,96 g (2,5 mmol) de dichlorhydrate de diéthyltétradécanediimidoate dans 12 ml d'éthanol anhydre et 0,63 ml de 1,2-diaminocyclohexane sont mis à reflux (90°C) pendant 48 heures. Après évaporation du mélange, on rajoute de l'éthanol dans la solution, on filtre et le filtrat évaporé est traité comme décrit pour le composé **9.0, 2HCl**. On obtient 0,82 g (67%) de cristaux.

RMN ^1H (DMSO- d_6 , 250 MHz), δ (ppm): 1,25 (s, 16H); 1,30-1,65 (m, 16H); 1,70 (m, 4H); 2,50 (t, 4H); 3,34 (m, 2H); 4,10 (m, 2H); 9,32 (m, 2H).

15

1,12-bis[(1,2,4-oxadiazole)-3-yl]dodécane: 18.0

A une suspension sous agitation de 2 g (7 mmol) de bis-amidoxime 1.15 dans 23.26 ml (139.86 mmol) d'orthoformiate d'éthyle, sont ajoutés 0.6 ml (4.9 mmol) de diéthyltrifluoroborane. Le mélange réactionnel est laissé sous agitation à température ambiante durant 15 minutes puis chauffé à reflux pendant 1 heure. A la solution obtenue sont ajoutés 150 ml d'acétate d'éthyle, et le mélange est lavé successivement avec de l'eau (100 ml), une solution saturée de bicarbonate de sodium (100 ml) et avec une solution saturée de chlorure de sodium (100 ml). La phase organique est ensuite séchée sur sulfate de sodium et évaporée sous pression

20

réduite. Le résidu obtenu est lavé avec de l'éther froid puis séché pour conduire à 1.50 g (70 %) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 92-93 °C.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.24 (s, 16H); 1.73 (m, 4H); 2.77 (t, 4H);

5 8.61 (s, 2H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1111 (C-O); 1558 (C=N); 3123 (=CH).

1,12-bis[(5-méthyl-1,2,4-oxadiazole)-3-yl]dodécane: 18.1

Une suspension sous agitation de 1.5 g (4.05 mmol) de **1.22** dans 30 ml de xylène, est chauffée à 150°C durant 2 heures. Le mélange réactionnel est ensuite évaporé sous pression réduite. Le résidu solide obtenu est par suite recristallisé avec de l'éther de pétrole pour conduire après séchage au dessiccateur, à 1.10 g (81%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 63-64 °C.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.23 (s, 16H); 1.69 (m, 4H); 2.53 (s, 6H);

15 2.66 (t, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1581 (C-N); 1640 (C=N)

1,12-bis[(5-trifluorométhyl-1,2,4-oxadiazole)-3-yl]dodécane: 18.4

Dans 20 ml (139.86 mmol) d'anhydride trifluoroacétique sous agitation et refroidie par un bain d'eau glacée, sont ajoutés portion par portion 1 g (3.50 mmol) de bis-amidoxime **1.15**. L'agitation est maintenue durant 30 minutes à froid jusqu'à dissolution complète de **1.15**. Au mélange réactionnel, sont ajoutés 50 ml d'éther et très lentement, 100 ml d'eau froide (réaction exothermique). La phase étherée est

ensuite lavée successivement avec 2 X 100 ml d'eau, 2 X 50 ml d'une solution de soude 1N et 100 ml d'eau. La phase organique est par suite séchée sur sulfate de sodium et évaporée sous pression réduite. Après refroidissement, le résidu cristallise pour donner 1.39 g (90%) de produit sous forme de cristaux blancs.

5 Point de fusion: < 40 °C.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.26 (s, 16H); 1.75 (m, 4H); 2.81 (t, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 766 et 1150 (CF_3); 1519 (C-N); 1608 (C=N)

1,12-bis[(5-trichlorométhyl-1,2,4-oxadiazole)-3-yl]dodécane: 18.5

Une suspension sous agitation de 3 g (10.49 mmol) bis-amidoxime 1.15 et de
 10 13.71 g (83.92 mmol) d'acide trichloracétique dans 10 ml de chloroforme est
 chauffée à 85°C jusqu'à obtention d'une solution. A la solution, est ajouté en trois
 portions égales, 4.70 ml (41.96 mmol) de trichloroacetyl chlorure. Le mélange
 réactionnel est ensuite chauffé à 94°C durant 45 minutes. Après refroidissement,
 200 ml d'acétate d'éthyle sont ajoutés puis le mélange est lavé successivement avec
 15 une solution saturée de carbonate de sodium (2 X 100 ml), une solution saturée de
 chlorure de sodium (2 X 100 ml) et avec 100 ml d'eau. La phase organique est
 ensuite séchée sur sulfate de sodium et évaporée sous pression réduite. Le résidu
 obtenu est séché pour conduire à 5.19 g (91%) de produit sous forme de poudre
 jaune.

20 Point de fusion: 55-56 °C.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.26 (s, 16H); 1.76 (t, 4H); 2.78 (t, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 798 et 830 (CCl_3); 1573 (C=N).

1,12-bis[(5-phényl-1,2,4-oxadiazole)-3-yl]dodécane: 18.6

Une suspension sous agitation de 1.5 g (3.04 mmol) de 1.23 dans 30 ml de xylène, est chauffée à 150°C durant 2 heures. La solution réactionnelle est ensuite décantée puis évaporée sous pression réduite. Le résidu solide obtenu est par suite
5 recristallisé avec de l'éther de pétrole pour conduire après séchage au dessiccateur, à 1.12 g (80%) de produit sous forme de poudre colorée

Point de fusion: 97-98 °C.

RMN ¹H (CDCl₃, 100 MHz), δ (ppm): 1.25 (s, 16H); 1.78 (m, 4H); 2.77 (t, 4H);
7.48 - 7.54 (m, 6H); 8.06 - 8.14 (m, 4H).

10 FT-IR, ν (cm⁻¹) : 1581 (C-N); 1640 (C=N)

1,12-bis[(5-éthylloxycarbonyl-1,2,4-oxadiazole)-3-yl]dodécane: 18.7

A une suspension sous agitation de 2 g (7 mmol) bis-amidoxime 1.15, de 4 ml (49.50 mmol) de pyridine et de 4 g de tamis moléculaire 4A dans 50 ml de chloroforme, sont ajoutés 2.35 ml (21 mmol) de chlorure d'oxalyl éthyle. Le
15 mélange réactionnel est ensuite chauffé à 80°C durant 16 heures puis filtré et évaporé sous pression réduite. Au résidu, 100 ml d'acétate d'éthyle sont ajoutés puis la solution est lavée successivement avec une solution saturée de carbonate de sodium (2 X 50 ml), une solution saturée de chlorure de sodium (2 X 50 ml) et avec
50 ml d'eau. La phase organique est ensuite séchée sur sulfate de sodium et
20 évaporée sous pression réduite. Le résidu froid obtenu est lavé avec de l'éthanol froid puis séché pour conduire à 1.96 g (62%) de produit sous forme de poudre.

Point de fusion: 70-71 °C.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.24 (s, 16H); 1.44 (t, 6H) 1.77 (m, 4H); 2.80 (t, 4H); 4.51 (quartet, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1029 et 1197 (C-O-C); 1584 (C=N); 1760 (COO)

5 **1,12-bis[(5-carbamoyl-1,2,4-oxadiazole)-3-yl]dodécane: 18.9**

A une solution d'éthanol ammoniacal 10% (90 ml) sont ajoutés 2 g (4.44 mmol) de 18.7. Le mélange réactionnel fermé hermétiquement est laissé sous agitation et à température ambiante durant 24 heures. La suspension est ensuite filtrée et lavée avec de l'éthanol froid puis séchée. 1.58 g (91%) de produit sont ainsi isolés sous forme de poudre jaune.

Point de fusion: 196-197 °C.

RMN ^1H ($\text{DMSO}-d_6$, 100 MHz), δ (ppm): 1.71 (s, 16H); 2.14 (m, 4H); 3.23 (t, 4H); 8.98 (s, 2H).

FT-IR, ν (cm^{-1}) : 1573 (C-N); 1604 (C=N); 1673 (CON); 3233 et 3432 (NH_2)

15 **1,12-bis[(5-cyano-1,2,4-oxadiazole)-3-yl]dodécane: 18.10**

A une suspension refroidie à 0°C de 1.5 g (3.83 mmol) de 18.9 et de 1.55 ml (19.13 mmol) de pyridine dans 60 ml de dioxane, sont ajoutés 1.3 ml (9.18 mmol) d'anhydride trifluoroacétique. Le mélange réactionnel est laissé sous agitation à température ambiante durant 16 heures. La solution obtenue est ensuite diluée avec 150 ml d'acétate d'éthyle puis lavée successivement avec de l'eau (100 ml) et avec une solution saturée de chlorure de sodium (2 X 100 ml). La phase organique séchée

sur sulfate de sodium et évaporée sous pression réduite conduit à 0.83 g (61%) de produit sous forme d'huile colorée.

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.24 (s, 16H); 1.73 (m, 4H); 2.81 (t, 4H).

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1561 (C=N); 2260 (CN)

5 **1,12-bis(*N,N'*-dibenzoyloxycarbonylguanidino)dodécane: 12.1**

Une solution de 1 g (5mmol) de 1,12-diaminododécane et de 3.76 g (10.5mmol) de *N,N'*-di-benzoyloxycarbonyl-S-méthylisothiourée dans 70 ml de tétrahydrofurane est chauffée entre 60 et 70°C pendant 24 H. Après quoi, le solvant est évaporé sous pression réduite. Le résidu obtenu est ensuite repris avec du dichlorométhane et lavé successivement avec une solution aqueuse de bicarbonate de sodium à 5%, une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium et d'eau. La phase organique est par suite, séchée sur du sulfate de sodium, évaporée sous pression réduite, et purifiée par chromatographie sur colonne de silice (DCM). Les différentes fractions réunies et évaporées sous pression réduite conduisent à une huile jaune qui cristallise dans l'éther pour donner 2.4 g (58%) de produit sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 97- 98 °C

RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.24 (s, 16H); 1.54 (s, 4H); 3.40 (q, 4H); 5.11 (s, 4H); 5.16 (s, 4H); 7.15- 7.54 (m, 20H); 8.28 (t, 2H); 11.73 (s, 2H)

20 FT-IR, ν (cm^{-1}): 1054 et 1130 (C-O); 1651 (C=N); 1736 (NCO); 3130 (NHCO); 3333 (NH)

SM-FAB $^+$: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 821; $[\text{M}+2\text{H}]^{++}/2$: 412

1,12-bis(*N,N'*-di-*tert*-butyloxycarbonylguanidino)dodécane: 12.2

Un mélange de 1 g (5 mmol) de 1,12-diaminododécane et de 3.19 g (11 mmol) de *N,N'*-di-*tert*-butyloxycarbonyl-S-méthylisothiourée dans 100 ml de méthanol, est chauffé entre 50 et 60°C durant 48 heures. Après évaporation sous pression réduite de la solution, le résidu obtenu est repris avec 100 ml de DCM et lavé successivement avec une solution aqueuse de NaHCO₃ à 5% (2 X 100 ml), de l'eau (2 X 100 ml) et avec 100 ml d'une solution saturée de NaCl. La phase organique est ensuite séchée sur sulfate de sodium, évaporée sous pression réduite et purifiée sur silice (DCM/MeOH 98%) pour conduire à 2.50 g (73%) de produit se cristallisant dans de l'éther de pétrole à froid sous forme de poudre.

Point de fusion: 114- 116 °C

RMN ¹H (CDCl₃, 100 MHz), δ (ppm): 1.24 (s, 16H); 1.47 (s, 36H); 1.61 (m, 4H); 3.35 (q, 4H); 8.27 (t, 2H); 11.48 (s, 2H)

FT-IR, ν (cm⁻¹) : 1028 et 1138 (C-O); 1670 (C=N); 1740 (NCO); 3132 (NHCO); 3314 (NH)

SM-ES+: [M+H]⁺: 685

Diiodhydrate de 1,12-bis[*N,N'*-(2-amino-3,4,5,6-tétrahydropyrimidyl)]dodécane: 16.0, 2HI

Le mélange réactionnel composé de 0,72 g (3,6 mmol) de 1,12-dodécanediamine, de 1,86 g (7,2 mmol) d'iodure de 2-méthylsulfanyl-3,4,5,6-tétrahydropyrimidinium et de 0,5 ml (3,6 mmol) de triéthylamine dans 20 ml d'acétonitrile est chauffé à reflux pendant 22h.. Après refroidissement à température

ambiante, le solvant de réaction est évaporé et le résidu est chromatographié sur colonne de silice ($\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{CH}_3\text{OH}/\text{NH}_4\text{OH}$ 89:10:1). 0,91 g de sel de guanidinium sont obtenus, soit un rendement de 41%.

RMN ^1H (CD_3OD , 100 MHz), δ (ppm) : 1,49 (m, 20H) ; 2,13 (m, 4H) ; 3,33 (m, 4H) ; 3,56 (m, 8H).

SM-FAB+: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 365; $[\text{M}+\text{H}+\text{HI}]^+$: 493

Diiodhydrate de 1,12-bis[*N,N'*-(5,5-diméthyl-3,4,5,6-tétrahydropyrimidin-2-yl)amino]dodécane: 17.0, 2HI

Le mélange réactionnel composé de 0,72 g (3,6 mmol) de 1,12-dodécanediamine, de 2,06 g (7,2 mmol) d'iodydhydrate 5,5-diméthyl-2-méthylsulfanyl-3,4,5,6-tétrahydropyrimidinium et de 0,5 ml (3,6 mmol) de triéthylamine dans 20 ml d'acétonitrile est chauffé à reflux pendant 22h.. Après refroidissement à température ambiante, le solvant de réaction est évaporé et le résidu est chromatographié sur colonne de silice ($\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{CH}_3\text{OH}/\text{NH}_4\text{OH}$ 89:10:1). 0,91 g de sel sont obtenus, soit un rendement de 36%.

RMN ^1H (CD_3OD , 100 MHz), δ (ppm): 1,17 (s, 12H); 1,49 (m, 20H); 3,07 (s, 8H); 3,23 (m, 4H).

Ditrifluoroacétate de [1-[*N*-(5,5-diméthyl-3,4,5,6-tétrahydropyrimidin-2-yl)amino]-12-[*N'*-(3,4-dihydro-2*H*-pyrrol-5-yl)amino]]dodécane: 25.0, 2TFA

Le mélange réactionnel composé de 1 mmol de ditrifluoroacétate de 1-[*N*-(5,5-diméthyl-3,4,5,6-tétrahydropyrimidinium-2-yl)amino]dodécane-12-ammonium, 1mmol (1éq.) de 3,4-dihydro-5-méthoxy-2*H*-pyrrole et 0,5 ml de triéthylamine dans

10 ml d'éthanol absolu est chauffé à reflux pendant 20 h.. Après refroidissement à température ambiante, le mélange réactionnel est évaporé à sec et chromatographié sur colonne de silice ($\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{CH}_3\text{OH}/\text{NH}_4\text{OH}$ 85:13:2) pour donner le produit, sous forme d'huile, avec un rendement de 65%.

5 RMN ^1H (CD_3OD , 360 MHz), δ (ppm) : 1,12 (s, 6H) ; 1,36 (m, 16H) ; 1,60 (m, 2H) ; 1,69 (m, 2H) ; 2,28 (m, 2H) ; 2,93 (m, 2H) ; 3,09 (s, 4H) ; 3,22 (m, 2H) ; 3,31 (m, 2H) ; 3,75 (m, 2H).

SM-ES $^+$: $[\text{M}+\text{H}]^+$: 378 ; $[\text{M}+\text{H}+\text{TFA}]^+$: 492 ; $[\text{M}+2\text{H}]^{++}/2$: 189,5

1,12-bis[*N,N'*-(3,4-dihydro-2*H*-pyrrol-5-yl)amino]dodécane: 21.0

10 A une solution de 2.76 g (10.1 mmol) de chlorhydrate de 1,12-diaminododécane dans 70 ml d'éthanol absolu, sont ajoutés 2.5 g (25,25 mmol) de 2-méthoxypyrroline. Le mélange réactionnel est laissé sous agitation et à température ambiante pendant 24 H. La solution est par suite évaporée sous pression réduite et le résidu après refroidissement, est repris avec 100 ml d'eau puis
15 alcalinisé avec une solution de soude 0.1 N. Après quoi, le précipité formé est essoré, lavé à l'eau puis à l'éther et séché au dessiccateur. On obtient 3,27 g (97%) du produit attendu sous forme de poudre blanche.

Point de fusion: 155-156°C

20 RMN ^1H (CDCl_3 , 100 MHz), δ (ppm): 1.23 (s, 16H); 1.49 (m, 4H); 1.89 (quint., 4H); 2.38 (t, 4H); 3.21 (t, 4H); 3.43 (s, 2H); 3.62 (t, 4H)

FT-IR, ν (cm^{-1}): 1630 (C=N); 3049 et 3221 (NH)

1,12-bis(*N,N'*-acetamidinyl)dodécane: 20.0

Un mélange de 2 g (10 mmol) de 1,12-diaminododécane et de 2,47 g (20 mmol) de chlorhydrate d'éthylacétimide dans 25 ml de dioxane anhydre est chauffé à reflux durant 24 heures. Après refroidissement à température ambiante, on ajoute une solution aqueuse de KOH 1N qui entraîne la formation d'un précipité. Ce
5 précipité est lavé au méthanol à chaud puis filtré. Après passage au dessiccateur plusieurs heures, 2,06 g (7,3 mmol) de produit sont obtenus, soit un rendement de 73%.

Point de fusion: 92-97°C

10 RMN¹H (DMSO-d₆, 250 MHz), δ (ppm) : 1,3 (m, 16H) ; 1,5 (m, 4H) ; 1,8 (s, 6H); 2,9 (t, 4H); 5,5 (m, 2H)

1,12-bis[*N,N'*-(2-iminopyrrolidiny)]dodécane: 24.0

A un mélange de 2,21 g (26 mmol) de pyrrolidin-2-one et de 0,23 g (10 mmol) de sodium chauffé à 90°C sous azote, sont ajoutés par petites fractions 1,64
15 g (5 mmol) de 1,12-dibromododécane. Ce mélange réactionnel est ensuite chauffé sous agitation à 120°C durant 4 heures. Après refroidissement à température ambiante, 40 ml d'eau sont additionnés et la solution est extraite avec 40 ml de DCM. La phase organique est ensuite lavée avec une solution aqueuse saturée de NaCl, séchée sur MgSO₄ puis évaporée sous pression réduite. Une purification sur
20 colonne de silice (éluant DCM-méthanol, [18-1]) suivi d'une co-évaporation à température ambiante avec un mélange éther-hexane conduit à 0,655 g de 1,12-bis[*N,N'*-(pyrrolidin-2-one-1-yl)]dodécane, avec un rendement de 39%. A un mélange de 0,336g (1mmol) de ce produit dans 3ml de chloroforme sous azote sont

ajoutés goutte à goutte 0,18 ml (2 mmol) de sulfonyl chlorure d'isocyanate dans 3 ml de chloroforme. La réaction est chauffée à 77°C pendant 6 heures. Après addition de 4,5 ml d'eau, la température du mélange réactionnel est ensuite portée à 95°C pendant 4 heures. Après quoi, 5 ml d'eau sont rajoutés et la solution est lavée avec 2 X 5 ml de DCM. La phase aqueuse est ensuite neutralisée par une solution aqueuse de KOH 1N et le solide est filtré, lavé à l'éther puis séché 1heure30 au dessiccateur pour conduire à 0,135 g (40%) de produit.

Point de fusion: 53-55°C

RMN ¹H (DMSO-d₆, 250 MHz), δ (ppm) : 1,3 (m, 16H) ; 1,5 (m, 4H) ; 1,8 (q, 4H); 2,3 (t, 4H); 3,2 (t, 4H); 3,3 (t,4H); 8,0 (s, 2H)

Etude des activités pharmacologiques des composés

selon l'invention.

A. Activité antipaludique *in vitro* contre *P. falciparum* et *in vivo* chez des souris infectées par *P. vinckei*

On rapporte dans les tableaux 4 et 5 ci-après les résultats des valeurs de CI₅₀ en μM et de DE₅₀ (mg/kg) obtenus avec des composés de l'invention.

TABLEAU 4

Série A

| Composé | CI ₅₀ (μM) | DE ₅₀ (mg/Kg) P. vinckei |
|------------|--------------------------|--|
| 1.0, 2 HCl | 0.3 10 ⁻³ | nd |
| 1.1 | nd | nd |
| 1.2 | 0,3 | ip 33 |
| 1.4 | 0,5 | nd |
| 1.5 | 0,4 | nd |
| 1.13 | 11 | ip < 20* |
| 1.15 | 3,5 | po = 120 |
| 1.16 | 6,8 | nd |
| 1.17 | 1,2 | nd |

| | | |
|-------------|---------------|------------------------|
| | | |
| 1.18 | 1,1 | nd |
| 1.19 | 3,6 | nd |
| 1.22 | 1,4 | nd |
| 1.23 | 1,1 | nd |
| 1.24 | 0,2 | po = 90 |
| 1.27 | 9,2 | nd |
| 1.28 | 0,2 | nd |
| 1.30 | 20 10^{-3} | ip = 20 |
| 2.0, 2 HCl | 0,7 10^{-3} | ip = 1,1* po = 40* |
| 3.0 | 4,9 10^{-3} | nd |
| 4.0, 2 HCl | 6,3 10^{-3} | nd |
| 5.0 | 0,1 | nd |
| 6.0 | 2 10^{-3} | ip = 3,4* po = 62* |
| 6.1 | nd | nd |
| 6.5 | 12,0 | ip < 20* po 100* |
| 6.8 | 69,5 | nd |
| 7.0, 2 HCl | 43 10^{-3} | nd |
| 8.0, 2 HCl | 2,3 10^{-3} | ip = 1,7* |
| 9.0, 2 HCl | 1 10^{-3} | ip = 7* po = 60* |
| 10.0, 2 HCl | 1 10^{-3} | ip = 6* po = 95* |
| 11.0, 2 HCl | 3 10^{-3} | ip = 8* po = 105* |
| 12.0, 2 HBr | 0,3 10^{-3} | nd |
| 12.2 | 1,9 | nd |
| 13.0, 2 HI | 1,6 10^{-3} | nd |
| 14.0, 2 HCl | 21 10^{-3} | nd |
| 15.0, 2 HBr | 1,7 10^{-3} | ip = 0,35* po = 45* |
| 16.0, 2 HI | 0,1 10^{-3} | nd |
| 17.0, 2 HI | 0,6 10^{-3} | nd |

* testé après 2 administrations du composé par jour pendant 4 jours

TABLEAU 5**Série B**

| Composé | CI ₅₀ (μ M) | DE ₅₀ (mg/Kg) P. vinckei |
|-------------|--------------------------------|---|
| 20.0 | $2 \cdot 10^{-3}$ | ip = 2,3* po nd |
| 21.0 | $3,8 \cdot 10^{-3}$ | ip = 2,8* po = 85* |
| 22.0, 2 HCl | $3 \cdot 10^{-3}$ | nd |
| 23.0 | $2,2 \cdot 10^{-3}$ | nd |
| 24.0 | $4 \cdot 10^{-3}$ | nd |
| 25.0, 2 TFA | $1,9 \cdot 10^{-3}$ | nd |

5

* testé après 2 administrations du composé par jour pendant 4 jours

La CI₅₀ est la concentration qui inhibe de 50% la croissance *in vitro* de *P. falciparum* (les mesures de CI₅₀ ont été déterminées selon la méthode de Desjardins dans laquelle l'incorporation d'[³H] hypoxanthine dans les acides nucléiques sert d'index de la viabilité cellulaire) (Desjardins RE, Canfield CJ, Haynes JD, Chulay JD. Quantitative assessment of antimalarial activity *in vitro* by a semiautomated microdilution technique. Antimicrob. Agents Chemother. 1979 ; 16 : 710-718) (figure 1), la DE₅₀ est la dose efficace pour inhiber de 50% la croissance *in vivo* de *P. vinckei* selon un test suppressif de 4 jours (Peters W, Portus JH, Robinson BL. The chemotherapy of rodent malaria. XXII. The value of drug-resistant strains of *P. berghei* in screening for blood schizonticidal activity. Ann. Trop. Med. Parasitol. 1975 ; 69 : 155-17).

IT correspond à l'index thérapeutique, IT= DL₅₀ (semi chronique)/DE₅₀ ;
ip : administration intrapéritonéale ; po : per os.

Ces résultats montrent que les composés de l'invention possèdent des fortes activités antipaludiques et antibabésia *in vitro* et *in vivo* ainsi qu'une bonne tolérance et une bonne absorption.

B. Paramètres pharmacocinétiques chez la souris

On rapporte ci-après les résultats des paramètres pharmacocinétiques après administration par voie intra-péritonéale ou orale chez la souris pour le composé 6.0.

Pour la détermination du niveau sérique, on utilise des bio-essais *ex vivo* : brièvement, le médicament est administré à l'animal, puis on procède à des prélèvements sanguins répétés. Les *sera* sont décomplémentés pendant 30 min à 56°C. Le contenu en métabolite actif est alors déterminé par incubation de différentes concentrations (dilution dichotonique) de chaque sérum, en présence de suspensions d'érythrocytes infectés par *P. falciparum*, selon la méthode de DESJARDINS à la [³H] hypoxanthine.

Les résultats sont exprimés en SI₅₀, ce qui correspond au pourcentage de sérum (contenant un métabolite actif) capable d'inhiber la croissance de *P. falciparum* de 50 %.

Cette valeur est alors transformée en concentration sérique, (habituellement exprimée en ng/ml) en testant le composé actif directement (sans passage chez l'animal), sur la même suspension infectée par *P. falciparum* et en déterminant sa valeur de CI₅₀ (en ng/ml) [taux sérique = CI₅₀] (en ng/ml) x 100/SI₅₀ (en %)].

Les résultats sont exprimés en log (taux sérique de médicaments), en fonction du temps, ce qui permet l'évaluation du demi-temps pour la distribution vers le compartiment sérique $t_{1/2(d)}$; du demi-temps pour l'élimination du compartiment sérique ($t_{1/2(e)}$) ; de C₀, correspondant au taux sérique extrapolé à l'origine dans la phase d'élimination ; de AUC (qui indique la quantité de drogue circulant dans le courant sanguin) ; et la bio-disponibilité relative dans le mode d'administration par voie orale, versus le mode par voie intrapéritonéale [AUC (po)/AUC (ip)] qui est significatif du degré d'absorption par voie orale.

Pharmacocinétique de 6.0

On administre à des souris des doses de 17 et 300 mg par kg de 6.0, par voie intrapéritonéale et par voie orale, ce qui correspond à des $DL_{50}/3$.

Le composé est solubilisé dans du DMSO à 10 %. Les résultats sont donnés dans le tableau 4.

- 5 La représentation semi-logarithmique permet de déterminer les paramètres pharmacocinétiques principaux du métabolite actif pour les deux voies d'administration. Les paramètres pharmacocinétiques sont $C_0 = 50$ ng/ml, $t_{1/2} = 16$ heures, $AUC = 310$ ng.h/ml après administration ip à 17 mg/kg, et $C_0 = 80$ ng/ml, $t_{1/2} = 17$ h, $AUC = 170$ ng.h/ml après administration orale à 300 mg/kg.

10 Pharmacocinétique de 21.0

Le composé 21.0 a été administré à la souris à des doses de 15 et 100 mg/kg, respectivement par voie intrapéritonéale et par voie orale, $DL_{50}/3$ en ip et $DL_{50}/4$ en po.

- 15 Après administration intra-péritonéale à 15 mg/kg, on obtient C_0 de 24 ng/ml avec $t_{1/2}$ d'environ 35 heures.


Par voie orale à 100 mg/kg, C_0 est de 16 ng/ml. Le $t_{1/2}$ apparent est de 36 heures.

C. Activités antibabésioses des composés

- 20 Les produits 6.0, 22.0, et 2.0 ont aussi été évalués *in vitro* pour leurs activités contre *Babesia divergens* et *B. canis*. Dans l'un et l'autre cas, les composés 6.0, 22.0, et 2.0 se sont montrés particulièrement actifs ($CI_{50} < 50$ nM). Ces résultats indiquent une activité antibabésia puissante pour ce type de composés.


REVENDECATIONS

1/ Composés présentant une activité anti-parasitaire, notamment antipaludique, caractérisés en ce qu'ils répondent à la formule générale (I)



dans laquelle

- soit X représente un groupe de formule (II)



où Z est un groupe $-(CH_2)_m$, avec $m = 8$ à 21 ,

$n = 0$ ou 1

et $Y = R_3$,

. R_1 et R'_1 , identiques ou différents l'un de l'autre, étant choisis parmi H, alkyl, aryl, OH, O-alkyl, O-aryl, O-CO-alkyl, O-CO-aryl, O-CO-O(ou S ou NH)-alkyl, O-CO-O(ou S ou NH)-aryl, PO(O-alkyl ou O-aryl)₂, CO-O-CH₂-aryl, cycloalkyl,

. R_2 et R'_2 , identiques ou différents l'un de l'autre, étant choisis parmi H, alkyl, CO-O-CH₂-aryl, CO-O-alkyl, cycloalkyl,

. R_3 et R'_3 , identiques ou différents l'un de l'autre, représentant H, alkyl, aryl, CO-O-alkyl, CO-O-aryl, COO-CH(R)-O-CO-alkyl, PO(O-alkyl ou O-aryl ou ONa)₂, CO-O-CH(R)-aryl,

. R étant H ou alkyl,


ou bien

. R₁ et R₂, et/ou R'₁ et R'₂, ou R₂ et R₃ et/ou R'₂ et R'₃, forment ensemble un hétérocycle avec le ou les atomes d'azote auxquels ils sont respectivement attachés,

5 ou encore,

. R₂ et R₃ et/ou R'₂ et R'₃ peuvent être le même substituant, doublement lié à l'azote, cyclisé avec, respectivement, R₁ ou R'₁ pour former un hétérocycle, le cas échéant substitué par R_a, qui est choisi parmi H, alkyl, alkyl substitué par 1,2 ou 3 atomes d'halogène, aryl, CO-O-alkyl (ou aryl), -CO-OH, -CO-NH₂, -CN, -CO-NH-alkyl (ou
10 aryl), -CO-N-(alkyl)₂, -CO-hétérocycle azoté et/ou oxygéné, NH(H ou alkyl), N(alkyl)₂, hétérocycle azoté et/ou oxygéné, -O-alkyl (ou aryl), -O-CH₂-aryl, CH₂N[H, (H, alkyl), (dialkyl), aryl], -CH₂-hétérocycle azoté et/ou oxygéné, CH₂-CO-OH,

- soit X = R₄ et Y représente un groupe de formule (III)



15 avec n et Z tels que définis ci-dessus,

. R₁ et R'₁, identiques ou différents l'un de l'autre, étant choisis parmi H, OH, O-alkyl, O-CO-O-alkyl (ou aryl), O-CO-S-alkyl, O-CO-alkyl (ou aryl), O-CO-NH-alkyl (ou aryl),

R_1 et R'_1 , identiques ou différents l'un de l'autre, étant choisis parmi H, alkyl, aryl, OH, O-alkyl, O-aryl, O-CO-alkyl, O-CO-aryl, O-CO-O(ou S ou NH)-alkyl, O-CO-O(ou S ou NH)-aryl, PO(O-alkyl ou O-aryl)₂, CO-O-CH₂-aryl, cycloalkyl,


. R_4 et R'_4 représentent un H ou alkyl, et

5 . R_2 et R'_2 , identiques ou différents l'un de l'autre, étant choisis parmi H, alkyl, CO-O-CH₂-aryl, CO-O-alkyl cycloalkyl, ou

. R_1 et R_4 et/ou R'_1 et R'_4 forment ensemble un groupe $-(CH_2)_p$, p étant un entier de 3 à 5, et R_2 et R'_2 représentant H, ou bien R_4 et R_2 et/ou R'_4 et R'_2 forment ensemble un groupe $-(CH_2)_p$, R_1 et R'_1 représentant H, et

10 les sels pharmacologiquement acceptables de ces composés.


2/ Composés selon la revendication 1, caractérisés en ce qu'ils répondent à la formule (IV)



dans laquelle n, Z, $R_1, R'_1, R_2, R'_2, R_3$ et R'_3 sont tels que définis dans la

15 revendication 1.

3/ Composés selon la revendication 2, caractérisés en ce qu'ils répondent à la formule (V)



dans laquelle Z, R₁, R'₁, R₂, R'₂, R₃ et R'₃ sont tels que définis dans la revendication 1.

4/ Composés selon la revendication 3, caractérisés en ce que R₁, R'₁, R₂, R'₂, R₃ et R'₃ sont indépendants les uns des autres.

5 5/ Composés selon la revendication 4, caractérisés en ce que R₁ et(/ou)R'₁ sont tels que définis ci-dessus, mais ne représentent pas un atome d'hydrogène, alors que R₃ et/ou R'₃, R₂ et/ou R'₂, représentent un atome d'hydrogène, R₁, R₂ et R₃.

6/ Composés selon la revendication 5, caractérisés en ce que R₁ et/ou R'₁, et R₂ et/ou R'₂ représentent un atome d'hydrogène, alors que R₃ et/ou R'₃ sont tels que
10 définis ci-dessus, mais différent d'un atome d'hydrogène.


7/ Composés selon la revendication 3, caractérisés en ce que

– R₁ et R₂, et/ou R'₁ et R'₂, ou


– R₂ et R₃, et/ou R'₂ et R'₃, ou

– R₁, R₂ et R₃ et/ou R'₁, R'₂ et R'₃ forment ensemble un hétérocycle.

15 8/ Composés selon la revendication 7, caractérisés en ce que R₁ et R₂ ainsi que R'₁ et R'₂ forment un hétérocycle et répondent à la formule (VI)



9/ Composés selon la revendication 7, caractérisés en ce qu'ils répondent à la formule (VII)




10/ Composés selon la revendication 8, caractérisés en ce que la formule (VI) R_1 et R_2 et/ou R'_1 et R'_2 forment ensemble un groupe $-\text{O}-\text{CO}-$, $\text{O}-\text{SO}-$, $\text{O}-\text{CS}$, $\text{S}-\text{CO}$ ou $-\text{S}-\text{CS}$, et R_3 et/ou R'_3 représentent un atome d'hydrogène.

11/ Composés selon la revendication 8, caractérisés en ce que R_1 et R_2 , et/ou R'_1 et R'_2 représentent un groupe alkylène éventuellement ramifié et R_3 et/ou R'_3 représentent $-\text{CO}-\text{O}-\text{alkyl}$ (ou aryl), $-\text{CO}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{aryl}$, $\text{CO}-\text{O}-\text{CH}(\text{alkyl})-\text{O}-\text{CO}-\text{alkyl}$, $\text{PO}(\text{O}-\text{alkyl}$ ou $-\text{aryl})_2$, alkyl ou H.


12/ Composés selon la revendication 9, caractérisés en ce que R_1 et/ou R'_1 représentent un atome d'hydrogène, et R_2 et R_3 , et/ou R'_2 et/ou R'_3 représentent un groupe $-(\text{CH}_2)_p-$.

13/ Composés selon la revendication 2, caractérisés en ce que R_2 et R_3 et/ou R'_2 et R'_3 forment un même substituant et forment ensemble avec R_1 ou respectivement R'_1 un bis-oxadiazole de formule (VIII.)




5 dans laquelle R_a est tel que défini ci-dessus.

14/ Composés selon la revendication 1, caractérisés en ce qu'ils répondent à la formule (IX)



15/ Composés selon la revendication 14, caractérisés en ce que $Z = \text{---}(\text{CH}_2)_m$ et
10 $n = 0$, les composés répondant à la formule (X)




16/ Composés selon la revendication 15, caractérisés en ce que les substituants sont indépendants les uns des autres.

17/ Composés selon la revendication 16, caractérisés en ce que R_1 et R_4 et/ou R'_1 et R'_4 sont tels que définis ci-dessus et R_2 et R'_2 représentent un atome d'hydrogène.

18/ Composés selon la revendication 16, caractérisés en ce que R_1 et R_4 et/ou R'_1 et R'_4 représentent ensemble un groupe $-(CH_2)_p-$ où p est un entier de 3 à 5 et R_2 et R'_2 représentent H.

19/ Composés selon la revendication 16, caractérisés en ce que R_1 et R'_1 représentent H et R_4 et R_2 et/ou R'_4 et R'_2 représentent ensemble un groupe $-(CH_2)_p-$ où p est un entier de 3 à 5.

20/ Composé selon la revendication 16, caractérisé en ce qu'il répond à la formule (XI)



21/ Procédé d'obtention de carbamates et de dérivés N-phosphorylés de formule générale (V) et (VI), caractérisé en ce qu'il comprend la réaction en milieu diphasique des composés bisamidines de formule générale (V) et (VI) dans lesquels R_3 et $R'_3 = H$ avec un dérivé $Cl-R_3$ (ou R'_3) où R_3 et R'_3 sont tels que définis ci-dessus et différents de H.


22/ Procédé d'obtention de dérivés d'amidoxime de formule générale (V) et (X), caractérisé en ce qu'il comprend la réaction en milieu basique des bisamidoximes de formules générale (V) et (X) dans lesquels R_1 et $R'_1 = OH$ et du réactif approprié.

17/ Composés selon la revendication 16, caractérisés en ce que R_1 et R_4 et/ou R'_1 et R'_4 sont tels que définis ci-dessus et R_2 et R'_2 représentent un atome d'hydrogène.

18/ Composés selon la revendication 16, caractérisés en ce que R_1 et R_4 et/ou R'_1 et R'_4 représentent ensemble un groupe $-(CH_2)_p-$ où p est un entier de 3 à 5 et R_2 et R'_2 représentent H.

19/ Composés selon la revendication 16, caractérisés en ce que R_1 et R'_1 représentent H et R_4 et R_2 et/ou R'_4 et R'_2 représentent ensemble un groupe $-(CH_2)_p-$ où p est un entier de 3 à 5.

20/ Composé selon la revendication 16, caractérisé en ce qu'il répond à la formule (XI)



21/ Procédé d'obtention de carbamates et de dérivés N-phosphorylés de formule générale (V), caractérisé en ce qu'il comprend la réaction en milieu diphasique des composés bisamidines de formule générale (V) dans lesquels R_3 et $R'_3 = H$ avec un dérivé $Cl-R_3$ (ou R'_3) où R_3 et R'_3 sont tels que définis ci-dessus et différents de H.

22/ Procédé d'obtention de dérivés d'amidoxime de formule générale (X), caractérisé en ce qu'il comprend la réaction en milieu basique des bisamidoximes de formules générale (X) dans lesquels R_1 et $R'_1 = OH$ et du réactif approprié.

23/ Procédé selon la revendication 22, caractérisé en ce que pour obtenir des composés de formule générale (VI) groupe a2 et (VIII) groupe a4 définis ci-dessus, on procède à une cyclisation intramoléculaire d'amidoxime ou de dérivés d'amidoxime précédemment définis de formule générale (V) groupe a1 en présence
5 du réactif approprié.

24/ Compositions pharmaceutiques, caractérisées en ce qu'elles renferment une quantité efficace d'au moins un composé tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 20 en association avec un véhicule pharmaceutique inerte.

25/ Compositions pharmaceutiques selon la revendication 24, caractérisées en
10 ce qu'elles sont administrables par voie orale, par voie injectable, ou encore par voie rectale.

26/ Compositions selon la revendication 24 ou 25 pour le traitement des maladies infectieuses, en particulier du paludisme, caractérisées en ce qu'elles comprennent une quantité efficace des composés selon l'une quelconque des
15 revendications 1 à 20.

27/ Utilisation d'au moins un composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 20 pour fabriquer des médicaments pour le traitement des maladies anti-parasitaires, en particulier du paludisme.

28/ Utilisation d'au moins un composé selon l'une quelconque des
20 revendications 1 à 20 pour fabriquer des médicaments pour le traitement des maladies anti-parasitaires, en particulier du paludisme et des babésioses.

FIGURE 1





FIGURE 1

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../2..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et
les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 270601

| | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|
| Vos références pour ce dossier (facultatif) | | CP/AC 60.735 |
| N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL | | 02 09 156 |
| TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) | | |
| Composés à activité anti-parasitaire et médicaments les renfermant | | |
| LE(S) DEMANDEUR(S) : | | |
| C.N.R.S. | | |
| DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : | | |
| 1 | Nom | VIAL |
| | Prénoms | Henri |
| Adresse | Rue | 23 Rue Pierre d'Auvergne |
| | Code postal et ville | 3 1 4 0 1 6 0 MONTPELLIER |
| Société d'appartenance (facultatif) | | |
| 2 | Nom | CALAS |
| | Prénoms | Michèle |
| Adresse | Rue | 360 Avenue du Père Prévost |
| | Code postal et ville | 3 1 4 0 1 9 0 MONTPELLIER |
| Société d'appartenance (facultatif) | | |
| 3 | Nom | ANCELIN |
| | Prénoms | Marie-Laure |
| Adresse | Rue | Chemin des Charretiers |
| | Code postal et ville | 3 1 4 2 1 7 0 ST JEAN DE CUCULLES |
| Société d'appartenance (facultatif) | | |
| S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages. | | |
| DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) | | |
| Mandataire : Chantal PEAUCELLE n° 92-1189 Le 19 décembre 2002 | | |

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2../2..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 270501

| | | |
|---|----------------------|--|
| Vos références pour ce dossier (facultatif) | | CP/AC 60.735 |
| N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL | | 02 09 156 |
| TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) | | |
| Composés à activité anti-parasitaire et médicaments les renfermant | | |
| LE(S) DEMANDEUR(S) : | | |
| C.N.R.S. | | |
| DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : | | |
| 1 | Nom | ESCALE |
| | Prénoms | Roger |
| Adresse | Rue | 12 ter Ancien chemin de Montpellier |
| | Code postal et ville | 3 4 7 9 0 GRABELS |
| Société d'appartenance (facultatif) | | |
| 2 | Nom | VIDAL |
| | Prénoms | Valérie |
| Adresse | Rue | 231, Rue Floréal, les Jardins de l'Aiguelongue |
| | Code postal et ville | 3 4 0 9 0 MONTPELLIER |
| Société d'appartenance (facultatif) | | |
| 3 | Nom | BRESSOLLE |
| | Prénoms | Françoise |
| Adresse | Rue | 5 rue Guy et Robert Bourrier |
| | Code postal et ville | 3 4 0 0 0 MONTPELLIER |
| Société d'appartenance (facultatif) | | |
| S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages. | | |
| DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) | | |
| Mandataire : Chantal PEAUCELLE n° 92-1189 Le 19 décembre 2002 | | |

PCT Application
FR0302283

